

«Top product»

Fertigofol Ultra

ES hnojivo



Složení:

Prvky	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	CaO	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
Koncentrace %	8,9	2,7	7,2	0,11	0,11		0,04	0,017	0,02	0,04	0,004	0,03
Obsah živin g/l	107	32,9	86,3	1,31	1,28		0,5	0,14	0,25	0,50	0,05	0,40



Efekt kvalitního
zabudování
mikroprvků

Působení hnojiva:

Dusík, fosfor, draslík, hořčík a další prvky jsou nezbytné pro dobrý růst a vývin rostliny. Podíl každého prvku je specificky navržen pro potřeby rostlin.

Stopové prvky se nacházejí v rovnováze, jsou ve formě syntetického chelátu, který zvyšuje úroveň absorpce a rostlina je velmi dobře přijímá.

FERTIGOFOL Ultra zlepšuje nutriční stav plodiny. Používá se jako aplikace na list. Aktivuje metabolismus v každé rostlinné buňce a je aktivátorem fotosyntézy.


FERTIGOFOL Ultra je polyvalentní produkt, který je vhodný pro řadu plodin, je speciálně přizpůsobený výživě, stimulaci a růstu rostlin.



Balení	Hustota
10l kanystr	1,19
600l IBC kontejner	

Aplikace
foliárně





1. Zásobárna dusíku
2. Restart plodiny
3. Zvýšená fotosyntéza
4. Aktivátor hormonů
5. Podpora kvetení
6. Podpora dozrávání
7. Zvýšení senzorických vlastností
8. Záruka homogenní úrody
9. Růst a rozvoj kořenů
10. Rozvoj kořenového vlášení

**ZVÝŠENÁ ODOLNOST
ROSTLINY VŮČI JARNÍM
KLIMATICKÝM STRESŮM**

Doporučení:

Plodiny	Dávka	Aplikační okno
Obilniny	3 l/ha min 100 l vody/ha	1. aplikace od prodlužování stébla do zduření pochvy praporcového listu, 2. aplikace od objevení se praporcového listu
Jarní ječmen		2 aplikace BBCH 30–40 dávka vody 200 l/ha
Luskoviny		1 aplikace při výšce porostu 5–10 cm, na začátku kvetení (ve fázi plochých lusků)
Brambory		3–4 aplikace od začátku tvorby hlíz a pak každých 14 dní
Kukuřice		1–2 aplikace od 4–6 listů a 10–15 dnů později pokud je třeba
Drobné ovoce		1–2 aplikace na plně vyvinuté listy
Řepka, slunečnice, mák, cukrovka		1–2 aplikace – v případě stresu po vzejití, pak pokud je třeba na plně vyvinuté listy
Plodová zelenina, košťáloviny		2 aplikace, každých 10–15 dní od zvětšování plodů
Vinná réva		2–3 aplikace od stadia oddělování svazků květů, začátkem kvetení a před uzavíráním hroznů, pak každých 10–14 dní pokud je potřeba
Jádroviny		4 aplikace od opadu okvětních lístků pak každých 14 dní
Okrasné květiny		1 aplikace před květem a 4 aplikace od opadu okvětních lístků, pak každých 14 dní