

# FANTIC<sup>®</sup> M

Účinná látka: 40 g/kg benalaxyl-M  
650 g/kg mancozeb

**Postřikový systémový a kontaktní fungicidní přípravek ve formě prášku dispergovatelného ve vodě k ochraně brambor proti plísni bramborové**

**Balení:** 5 kg  
**Registrační číslo:** 4654-0  
**Doba použitelnosti:** při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby  
**Formulace:** prášek dispergovatelný ve vodě

## PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

Benalaxyl-M je systemický fungicid ze skupiny fenylamidů pro použití na vybraných plodinách na ochranu proti chorobám způsobeným různými druhy z čeledi *Peronosporales*. Mancozeb je kontaktní fungicid účinný proti širokému spektru hubových patogenů. Benalaxyl-M se širokým fungicidním spektrem, kterého dosahuje v kombinaci s kontaktním fungicidem mancozebem, je velmi rychle přijímán listy a stonky, je translokován směrem nahoru do rostliny, včetně nových přírůstků. Vyznačuje se dlouhou perzistencí, umožňuje prodloužit intervaly mezi ošetřeními. Přípravek zastavuje růst mycelia fytopatogenů v jejich saprofytické fázi, zatím co u obligátních parazitů inhibuje v nízké koncentraci vývoj mycelia a ve vyšší koncentraci uvolněné zoospory a taky jejich klíčení. Inhibice uvolňovaných a klíčících zoospor se uskutečňuje různým způsobem účinku vzhledem k charakteru aktivit na myceliu v pletivu hostitele.

## SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Fantic M působí proti houbám *Plasmopara*, *Phytophthora*, *Perenospora*, *Pythium* a *Bremia*. Používá se pro ochranu natě brambor vůči plísni bramborové. Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti plísni bramborové na hlízách. Přípravek je vhodné použít proti plísni bramborové v celé oblasti pěstování brambor v České republice.

## DOPORUČENÍ K APLIKACI

Plodina	Škodlivý organismus	Dávka kg/ha	Ochr. lhůta (dny)	Poznámka
Brambor	plíseň bramborová	2,5	14	preventivně, max. 3x

### APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Fantic M se aplikuje preventivně před výskytem prvních symptomů napadení chorobou. Používá se zejména na první postřiky v době, kdy rostliny intenzivně rostou. Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači v intervalu 7 až 10 dnů. Aplikaci vykonávejte, když povrch listů je suchý. Přípravek aplikovaný v registrované dávce a v souladu s návodem na použití nepředstavuje pro brambory žádné riziko fytotoxicity. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Použití v množitelských porostech brambor konzultujte s držitelem registrace přípravku. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny fenylamidů vícekrát než 3x za vegetační období. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny fenylamidů jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu.

### DÁVKA VODY

300–600 l/ha

### MÍSELNOST

Přípravek Fantic M je mísitelný s běžně používanými insekticidy (Alfametrin) a kapalnými hnojivy (Wuxal).