


POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ DO CUKROVKY



setí	před vzejtím	klíčení	děložní listy	základ pravých listů	2-4 listy	4-6 listů	před zapojením řádků	plná vegetace
Hnojení pod patu při seti MICROSTAR PZ								
		RAVANE, SCATTO						
		METAREX INOV, IRONMAX PRO						
		TARGET SC, OUTLOOK						
		SHIRO, FENIFAN, GOBI, VIVENDI 600, TOPKAT						
		TANDEM STEFES / FENIFAN + STEMAT SUPER						
		GONDOR						
						ALICUPRIN, WUXAL BORON PLUS, WUXAL SUPER, WUXAL TOP P		
							SPINNER XL EMINENT 125 ME	

ÚČINEK HERBICIDŮ AGRO ALIANCE NA PLEVELE V CUKROVCE – 1. část

	SHIRO	FENIFAN	TOPKAT	STEMAT SUPER	TARGET SC
BAŽANKA ROČNÍ	●●	●	●	●●	●(●)
BÉRY	○	○	●●	●(●)	○
DRCHNIČKA ROLNÍ	●	●	●	●●	(●)
DURMAN	●●	●	○	●(●)	(●)
HEŘMÁNKY	●●●	○	●●	○	●●
HLUCHAVKY	●●	●●	●●●	○	●●
HOŘČICE	●●●	●●	●	○	●●
JEŽATKA KUŘÍ NOHA	●	○	●●	●	○
KOKOŠKA P TOBOLKA	●●●	●●	●	●●	●(●)
KOLENEC ROLNÍ	●●	●●	●	●●	●●
KONOVICE POLNÍ	●●●	●●	●●	●	●
LASKAVCE	●●●	(●)	●●	(●)	●
LEBEDY	○	●●			(●)
MERLÍKY	○	●●	●	(●)	●●
OHNICE	●●	●●		○	●●
OVES HLUCHÝ	○	○	●●	●	○
PENÍZEK ROLNÍ	●●●	●●	●	○	●●
PĚŤOUR MALOÚBORNÝ	●	●●	●	○	●
POHANKA OPLETKA	○	●	●	(●)	(●)

- účinnost 95–100 %
- účinnost nad 90 %
- (●) účinnost nad 90 % pouze ve fázi děložních listů
- účinnost 70–90 %
- účinnost 70–90 % pouze ve fázi děložních listů
- (●) neúčinkuje
-

ÚČINEK HERBICIDŮ AGRO ALIANCE NA PLEVELE V CUKROVCE – 2. část

	SHIRO	FENIFAN	TOPKAT	STEMAT SUPER	TARGET SC
PTAČINEC ŽABINEC	●	●●	●●	●●	●●
RDESNO BLEŠNÍK	●●	○	●	●●	●(●)
RDESNO ČERVIVEC	●●	○	●	●●	●(●)
ROZRAZILY	●	●	●●●	●	●(●)
ŘEPKA VÝDROL	●●●	○	○	○	●(●)
STARČEK OBECNÝ	●	●●	●	○	(●)
SVÍZEL PŘÍTULA	●●●	○	●	●●	(●)
TETLUCHA KOZÍ PYSK	●●●	○	●●	○	●(●)
TRUSKAVEC PTAČÍ	●(●)	○	○	●(●)	(●)
VIOLKY		●	○	●●	●(●)
ZEMĚDÝM LÉKAŘSKÝ		●●	●●	●	●

- účinnost 95–100 %
- účinnost nad 90 %
- (●) účinnost nad 90 % pouze ve fázi děložních listů
- účinnost 70–90 %
- (●) účinnost 70–90 % pouze ve fázi děložních listů
- neúčinkuje

**PŘÍKLADY PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ HERBICIDŮ FIRMY AGRO ALIANCE
V CUKROVCE**

Program		
č. 1	Běžné zaplevelení – ÚSPORNÝ PROGRAM	
T1	Fenifan + Stemat Super + Gondor	2,5 + 0,15 + 0,2 l/ha
T2	Tandem Stefes FL + Fenifan + Shiro + Gondor	1,0 + 1,5 + 30 g + 0,2 l/ha
T3	Tandem Stefes FL + Fenifan + Shiro + Target SC + Gondor	1,5 + 1,0 + 30 g + 1,5 + 0,2 l/ha
č. 2	Běžné zaplevelení + VÝDROL ŘEPKY, laskavce, rdesna, tetlucha	
T1	Fenifan + Stemat Super + Topkat + Shiro + Gondor	2,5 + 0,2 + 0,3 + 20 g + 0,2 l/ha
T2	Tandem Stefes FL + Fenifan + Shiro + Topkat + Gondor	1,0 + 1,5 + 30 g + 0,5 + 0,2 l/ha
T3	Tandem Stefes FL + Fenifan + Shiro + Target SC + Topkat + Gondor	1,5 + 1,5 + 30 g + 1,0 + 0,5 + 0,2 l/ha
č. 3	Běžné zaplevelení + výdrol řepky, laskavce, rdesna, tetlucha + TRÁVOVITÉ plevele	
T1	Fenifan + Stemat Super + Topkat + Shiro + Gondor	2,5 + 0,2 + 0,3 + 20 g + 0,2 l/ha
T2	Tandem Stefes FL + Fenifan + Shiro + Target SC + Topkat + Gondor	1,0 + 1,5 + 30 g + 1,0 + 0,6 + 0,2 l/ha
T3	Tandem Stefes FL + Fenifan + Shiro + Target SC + Topkat + Gondor	1,5 + 1,5 + 30 g + 1,5 + 0,6 + 0,2 l/ha



- Poznámka:**
- T1 plevelé ve stádiu děložních listů bez ohledu na vývojové stádium řepy
 - T2 druhá aplikace za 5–9 dní po vzejití další vlny plevelů, plevelé musí být ve stádiu děložních listů
 - T3 třetí aplikace po vzejití další vlny plevelů
- Dávka vody:** 150–200 l/ha podle přípravků nebo jejich kombinací