

DESTOR[®]

Účinná látka: desmedipham 160 g.l⁻¹

HERBICÍDY

DESTOR je herbicíd vo forme suspenznej emulzie určený na ochranu proti jednoročným dvojkličnolistovým burinám vrátane láskavca ohnutého v repe cukrovej, repe krmnej a v cvikle.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok obsahuje účinnú látku desmedipham. Desmedipham patrí do chemickej skupiny fenylkarbamátov. Táto látka brzdí prenos elektrónov pri fotosyntéze a ich prichytenie na receptoch fotosystému II. Desmedipham sa používa pri postemergentnej aplikácii proti dvojkličnolistovým burinám v porastoch repy po ich vzídení. Desmedipham účinkuje výlučne cez listy a nie je závislý, za normálnych okolností rastu, od druhu pôdy a jej vlhkosti. Pri aplikácii sa zvažuje iba stupeň vývoja burín, pričom optimálne účinky dosiahnete keď sú buriny vo fáze tvorby prvého kľúčneho listu.

SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

Citlivé buriny: láskavec ohnutý, kapsička pastierska, mrlík figolistý.

Stredne citlivé buriny: mrlík biely, hluchavka purpurová, hviezdica prostredná, fialka roľná.

NÁVOD NA POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA l.ha ⁻¹	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repa cukrová, repa krmná, cvikla	dvojkličnolistové buriny	3 l 1,5 l x 2	AT AT	DA

AT – ochranná doba je stanovená odstupom medzi termínom aplikácie (posl. aplik.) a zberom.

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l.ha⁻¹.

Maximálny počet aplikácií: 2x v plodine (max. 3 l prípravku).

Aplikujte najneskôr v BBCH 14 (cvikla) a v BBCH 31 (repa krmná a cukrová repa).

Rastová fáza plodiny v čase prvého ošetrenia: BBCH 10-11.

Rastová fáza buriny: BBCH 10 optimálne vo fáze prvých kľúčnych listov buriny.

Interval medzi aplikáciami: 5-14 dní, po vzídení novej vlny burín.

DESTOR je herbicíd, ktorý sa používa na ochranu proti jednoročným dvojkličnolistovým burinám vrátane láskavca ohnutého a po ich vyklíčení v porastoch repy cukrovej, repy krmnej a cvikly. Je to kontaktný herbicíd, ktorý je absorbovaný listami burín a prenáša sa najmä do apoplastu rastliny. Lepšie výsledky dosiahnete rovnomerným pokrytím celého povrchu buriny postrekom,

keď buriny aktívne rastú a sú v skorom rastovom štádiu t.j. vo fáze kľúčnych listov. V prípade potreby ak sa objavia nové buriny, je možné aplikáciu zopakovať.

DESTOR® nie je vhodné používať v porastoch, ktoré sú v nepriaznivých, stresových podmienkach napr. po použití iných pesticídov, poškodené vetrom, trpia nedostatkom vápnika či iných živín, sú napadnuté živočíšnymi škodcami alebo hubovými chorobami a podobne, nakoľko takto by mohli vzniknúť nenapraviteľné škody na úrode.

Prípravok odporúčame aplikovať pri vonkajších teplotách nad +21 °C až vo večerných hodinách. Nepostrekujte pri mrazoch alebo keď sa mrazy očakávajú. Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať intervalom aplikácie, následným agrotechnickým operáciám na ľahkých pôdach a pri vlhkom počasí.

Porast nevalcujte a neošetrujte bránami 7 dní pred a po aplikácii prípravku.

Nepostrekujte keď sa očakáva dážď, keď sú listy mokré, prší alebo mrholí.

Prípravok sa aplikuje pozemne postrekom schváleným postrekovačom. Postrekujte iba za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere po vetre od ďalších osôb.

Prípravok DESTOR® nie je povolený pre leteckú aplikáciu.

Nie je možné vylúčiť prechodné príznaky fytotoxicity na ošetrovanej plodine. Citlivosť odrody ošetrovanej plodiny konzultujte s držiteľom registrácie. Prípravok nie je určený na použitie v množiteľských porastoch.

Pestovanie následných plodín bez obmedzenia. Prípravok nesmie zasiahnuť susedné porasty. Postrekovač naplňte čistou vodou do polovice jeho objemu a zapnite miešacie zariadenie. Pridajte potrebné množstvo prípravku s ktorým chcete DESTOR® kombinovať a nakoniec pridajte potrebné množstvo DESTOR®-u. Postrekovač doplňte potrebným množstvom vody a zmes miešajte. Miešacie zariadenie nechajte počas aplikácie zapnuté. Nepoužívajte vodu s vyšším obsahom vápnika alebo železa. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Balenie: 5 l HDPE/PA kanister