

PARDNER® 22,5 EC

Účinná látka: bromoxynil 225 g.l⁻¹

Postrekový herbicídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentráту určený proti dvojkličnolistovým burinám v obilninách a kukurici.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

PARDNER® 22,5 EC pôsobí prevažne ako dotykový herbicíd na vzídené dvojkličnolistové buriny, ktoré sú v rastovej fáze 2-4 pravých listov. Bromoxynil je prijímaný listami a blokuje fotosyntézu burín. Zpôsobuje zasychanie burín a ich následné odumieranie. Účinok na buriny sa prejavuje do 24 hodín po ošetrení drobnými nekrotickými škvrnami. Citlivé druhy burín ničí za 2-3 dni po ošetrení, k úplnému zničeniu burín dochádza zvyčajne za 4-5 dní po postreku. Účinok prípravku priaznivo ovplyvňuje vyššia teplota a slnečný svit pri aplikácii a po nej. Neodporúčame ošetrovať pri teplotách vyšších ako +25°C.

SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

Citlivé buriny: redkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, mrlík obyčajný, horčičky (obyčajný, štiavolistý), rumančeky, parumanček nevoňavý, láskavce, ľuľok čierny, lipkavec obyčajný, mak vlčí, veroniky, durman, zemedym lekárske, peniažtek roľný.

Stredne citlivé buriny: konopnica napuchnutá, hviezdička prostredná, hluchavky, fialka roľná. Dočasne poškodzuje viacročné hlboko koreniace buriny ako sú pichliač roľný, mlieč roľný, praslička roľná.

NÁVOD NA POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA l.ha ⁻¹	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jačmeň jarný, jačmeň oz., ovos, raž, pšenica jarná, pšenica oz., tritikale	dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel® 300
obilniny s podsevom lucerny	dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA l.ha ⁻¹	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kukurica	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec	1,25-1,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Laudis® OD
		1,0 l + (2,0 l)	AT	(TM) Monsoon®, Equip® Ultra, Musketeer® Plus

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Dávka vody na 400–600 l.ha⁻¹.

Počet ošetrení: max 1x za sezónu.

Obilniny s podsevom lucerny ošetríte v dobe, keď má lucerna vyvinutý aspoň jeden trojlístok a buriny majú 2-4 pravé listy (BBCH 12-14). Na prerastené buriny sa herbicídny účinok znižuje. Obilniny možno ošetrovať od 2 listov do začiatku predlžovania stebľa (BBCH 12-30).

Kukuricu ošetríte v dobe, keď majú buriny 2-4 pravé listy (max. 6 listov, t.j. BBCH 12-14, max. 16) a výška kukurice nepresiahne 20 cm. Neošetríte pri teplotách nad +20°C! Vyššiu dávku použite na pokročilejšie rastové fázy burín, prípadne buriny v listovej ružici. Nepoužívajte na malé rastliny kukurice, zoslabnuté porasty, ošetríte najmenej 6 hodín pred predpokladaným dažďom.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tankmix kombinácií v menšej nádobe pri správnom nariadení. Kontrolujte možnosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 min. státi! Najskôr rozpustite práškové prípravky, až potom vlejte tekuté.

MENEJ VÝZNAMNÉ POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA l.ha ⁻¹	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	dvojkličnolistové buriny	0,5-1 l	28 dní	

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody 200–400 l.ha⁻¹.

Počet ošetrení: max. 1 x za sezónu.

Cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky: prípravok aplikujte v rastovej fáze 1. listu až jasne viditeľného 3. listu cibule (BBCH 11-13), max. do 4 listov buriny (BBCH 14).

Balenie: 5 l coex kanister