

RANGO® SUPER

Účinná látka: quizalofop-p-tefuryl 40 g.l⁻¹

Postrekový herbicidný prípravok vo forme emulgovateľného koncentráту určený na postemergentnú aplikáciu proti jednoročným a trváčim trávam v repe cukrovej, repke ozimnej, hrachu, slnečnici a v iných plodinách.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok RANGO® SUPER je selektívny postemergentný herbicid so systémovým účinkom. Účinná látka quizalofop-P-tefuryl náleží do skupiny aryloxyfenoxypropionátov (FOPs) a pôsobí ako inhibitor syntézy lipidov. Je absorbovaná povrchom listov a translokovaná po celej rastline aj xylémom aj floémom, a hromadí sa v meristematickom tkanive. Účinok sa prejavuje sa farebnými zmenami citlivých rastlín – žltnutie alebo fialovenie. K uhynutí zasiahnutých citlivých tráv dochádza závislosti na teplote počas 2-3 týždňov.

Citlivé buriny: širok alepský, ježatka kuria, ovos hluchý, proso siate, prstovka, výmrav obilnín, pýr plazivý.

NÁVOD NA POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL'	DÁVKA l.ha ⁻¹	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repa cukrová, repa krmná, sója, šošovica, hrach, fazuľa, bôb, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, rasca, mrkva, mrkva krmná, petržlen, tabak, ľan	jednoročné trávy	1-1,5l	AT	
	pýr	2,5l	AT	
pažitka, petržlen, cibuľa	jednoročné trávy	1-1,5l	AT	semenné porasty
	pýr	2,5l	AT	semenné porasty
repka ozimná	jednoročné trávy, výdrv obilnín	1-1,5l	AT	
	výdrv obilnín	0,8l	AT	skorá jeseň
	pýr	2-2,5l	AT	
zemiaky, slnečnica	jednoročné trávy	1-1,5l	AT	
	pýr	2,25-2,5l	AT	

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Odporúčaná dávka vody: 200-400 l.ha⁻¹, počet aplikácií max 1x.

Aplikujte ho v období, keď sú trávy v plnom raste. Pre jednoročné trávy je vhodný termín aplikácie od vývojového štádia 2 listov, pre trváce trávy od vývojového štádia 4-6 listov. V repke na jeseň proti skorým rastovým štádiám výmrvu obilnín do 3 listov postačí dávka 0,8 l.ha⁻¹.

RANGO® SUPER sa nesmie používať vo zmesi s akýmkoľvek ďalším prípravkom obsahujúcim „fop“ (aryloxyfenoxypionát) skupinu herbicídov alebo následne s akýmkoľvek herbicídov ACC-áza inhibítorom behom jednej vegetačnej periódy a nemala by byť použitá v spojení s ďalšími herbicídmi využívajúcimi viacnásobný spôsob účinku s prekrývajúcim sa spektrom burín v oševnom postupe, následne alebo vo zmesi. Ak je to možné, používajte neselektívne herbicidy k ničeniu včasne vzídených burín (pred vzídením plodiny). Vyhnite sa ďalšiemu použitiu rovnakého herbicidu alebo herbicídov, ktoré majú rovnaký spôsob účinku na rovnakom poli, pokiaľ to nie je integrované s ďalšími postupmi hubenia burín. Pri použití prípravku v súlade s návodom k použitiu nemá nepriaznivý vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny.

Balenie: 1 l HDPE fľaša, 5 l HDPE kanister, 10 l HDPE kanister