

CE

BORONIA

JEDNOSLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO SE STOPOVÝMI ŽIVINAMI KfV 1(C)(II)(a)

Roztok borethanolaminu

ŽIVINY:

% hmotnostní	živina
11 %	Bor (B) vodorozpustný jako ethanolamin (150 g/l)

SLOŽKY:

Borethanolamin CAS: 26038-87-9 (KSM1*)

KSM1*: Látky a směsi z původního materiálu

NÁVOD A DÁVKOVÁNÍ:

plodina	dávka	poznámka
Obilniny	0,3 l/ha	1 aplikace na jaře
Mák	1 l/ha min. 200 l vody/ha	1 – 2 aplikace ve stádiu 6 – 8 listů
Slunečnice	1 - 3 l/ha min. 200 l vody/ha	2 aplikace od fáze 5 párů pravých listů do fáze před květem
Cukrová řepa	1 - 3 l/ha min. 200 l vody/ha	2 aplikace na začátku růstu a na dobře zapojený porost
Polní brukvovité plodiny, řepka olejka	1 - 3 l/ha min. 200 l vody/ha	1 - 2 aplikace od 2 - 3 listů do začátku květu
Luskoviny	1 - 3 l/ha min. 600 l vody/ha	1 - 2 aplikace od 5 - 6 listů do fáze před květem
Ovocné stromy (jádroviny, peckoviny)	1-2 l/ha 2 l/ha min. 600 l vody/ha	2 aplikace za rok 1. Aplikace ve stádiu poupěte 2. Aplikace před opadem listů
Jahody	1 l/ha min. 600 l vody/ha	2 dávky ve stádiu po odkvětu a po 14 dnech
Zelenina	1 - 3 l/ha min. 600 l vody/ha	1 až 2 aplikace na dobře zapojený porost nebo před a po květu
Vinná réva	1 - 2 l/ha min. 500 l vody/ha	Aplikace ve fázích: - objevení květenství, - květenství plně vyvinuté - na konci květu

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.

Určený k aplikaci na půdu a na list.

Aplikace postřikem na půdu, v dávce: 8 - 10 l/ha, před výsevem nebo sázením.

UPOZORNĚNÍ:

Pro dosažení co nejlepších výsledků použijte dostatečné množství vody (aplikujte do skanutí). Neaplikujte v době silného slunečního záření a/nebo vysokých teplot vzduchu. Pokud je to možné aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy nejvyšší denní teplota překročí 28°C. Vhodná teplota k aplikaci 6 – 25 °C. Velmi mladé listy a plodiny ve stresu mohou být náchylnější ke spálení (za těchto okolností používejte nižší dávky a přiměřeně zredukovat aplikační interval). Viz doporučení aplikační dávky a aplikační termíny uvedené na této etiketě pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovní použití.

#Názov?

- Nádrž postřikovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení.
- Přidejte potřebné množství tohoto produktu, a pak přidejte zbytek vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Při kombinaci s dalšími složkami v tank-mix, tento produkt přidávejte vždy jako poslední. Nenechte směs stát bez zapnutého míchacího zařízení.
- Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřikovací zařízení.

Fyzikální-chemické vlastnosti:

hustota: 1,37 kg/l

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřené, na bezpečném místě mimo dosahu dětí, zvířat a potravin. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ:

Při používání nejezte a nepijte. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice. Po práci si omyjte ruce a obličej.

Nevylévejte do kanalizace; Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Kontejner po vyprázdnění vypláchněte tři krát čistou vodou. Výplachovou vodu použijte k přípravě aplikační směsi. Prázdné obaly předejte do sběru k recyklaci. Prázdný obal nespálujte a nepoužívejte žádným k jiným účelům. Výrobce a dodavatel tohoto produktu zaručují obsah specifických účinných složek v akceptovatelné toleranci při balení. Neposkytuje se žádná záruka jakéhokoliv druhu související s použitím tohoto hnojiva ani žádná odpovědnost nebude akceptována za škody vyplývající ze skladování, manipulace nebo jeho používání.

PRVNÍ POMOC:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

Při nadýchání:

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí:

Okamžitě odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlažné tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující.

Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě : 224 919 293 nebo 224 915 402.

Množství: Objem balení: 10 L; čistá hmotnost: 13,7 kg

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Distributor: Agro Alliance s.r.o., 252 26 Třebotov 304, tel:257 830 138

Výrobce: Agronutrition-Parc activestre 3, avenue de l'Orchidée-31390 Carbonne, Francie

OZNAČENÍ:

Výrobek není klasifikován podle nařízení (ES) č. 1272/2008

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.