

# Ochrana a výživa řepky olejky 2025

**Novinky !**

**Tamer**

(acetamiprid)

**Aldifol 250 EC**

(difenokonazol)

**Rapuzi 500 SC**

(metazachlor)

PREEMERGENTNÍ HERBICIDY

Clomate

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Účinná látka: | 360 g/l klomazon |
|---------------|------------------|

- Přednosti:**
- spolehlivý účinek na svízel přitulu, kokošku, ptačinec a další dvouděložné plevely
  - aplikace do 3 dnů po zasetí
  - vhodný partner do TM směsí s ostatními herbicidy registrovanými do řepky

Devrinol 45 F

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Účinná látka: | 450 g/l napropamid |
|---------------|--------------------|

- Přednosti:**
- registrace do řepky, papriky, výsadby rajčat a brukvovité zeleniny
  - spolehlivě hubí heřmánkovité plevely, mák vlčí, penízek, merlíky, ptačinec žabinec, chundelku metlice a další jednoděložné i dvouděložné plevely
  - nejšetrnější herbicid ke všem odrůdám řepky ze současného sortimentu
  - určen pro preemergentní aplikace v dávce 2,0–2,5 l/ha spolu s účinnou látkou *klomazon* do 3 dnů po zasetí



Kumak 283 SE

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Účinné látky: | 33 g/l klomazon<br>250 g/l metazachlor |
|---------------|----------------------------------------|

- Přednosti:**
- ready mix dvou ověřených účinných látek
  - aplikace do 3 dnů po zasetí v dávce 3,0 l/ha
  - přijímán zejména kořenovým systémem
  - komplexní herbicid, spolehlivě hubí jednoděložné i dvouděložné plevely

Rapuzi 500 SC **NOVINKA**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Účinná látka: | 500 g/l metazachlor |
|---------------|---------------------|

- Přednosti:**
- hubí jednoděložné i dvouděložné plevely
  - přijímán zejména kořenovým systémem
  - dávka 1,5 l preemergentně od 00 BBCH do 09 BBCH
  - dávka 1,5 l prostmergentně od 10 BBCH do 16 BBCH
  - výborný partner do TM směsí (Clomate, ...)



POSTEMERGENTNÍ HERBICIDY

Gobi

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Účinná látka: | 50 g/l chizalofop-P-ethyl |
|---------------|---------------------------|

- Přednosti:**
- účinek na výdrol již od 0,7 l/ha ve fázi do 3 pravých listů obilnin
  - dávka 1,0 l/ha na výdrol od 4. listu
  - pýrohbná dávka na podzim 2,5 l/ha na jaře jen 2,0 l/ha
  - vhodný partner do TM směsí s ostatními přípravky na ochranu registrovanými do řepky

Vivendi 600

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Účinná látka: | 600 g/l klopýralid |
|---------------|--------------------|

- Přednosti:**
- vynikající účinek na heřmánkovité plevely a pcháč oset
  - řepka olejka dávka 0,33 l/ha
  - velmi příznivá cena ošetření
  - vhodný partner do TM směsí

APLIKACE NA STRNIŠTĚ

Halvetic

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Účinná látka: | 180 g/l glyfosát |
|---------------|------------------|

- Přednosti:**
- unikátní formulační technologie BGT<sup>®</sup>
  - aplikace po sklizni na strniště v dávce 2,5–4,0 l/ha
  - spolehlivě hubí jednoleté i vytrvalé plevely (pcháč oset, pýr plazivý, svačec rolní apod.)

Kaput Green

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Účinná látka: | 360 g/l glyfosát |
|---------------|------------------|

- Přednosti:**
- spolehlivě hubí jednoleté i vytrvalé plevely (pcháč oset, pýr plazivý, svačec rolní apod.)
  - aplikace pouze po sklizni na strniště



FUNGICIDY

Aldifol 250 EC NOVINKA

Účinná látka: 250 g/l difenokonazol

- Přednosti:**
- systémový, širokospektrý fungicid
  - NEMÁ MORFOREGULAČNÍ účinky – vhodný pro trpasličí odrůdy a do suchých oblastí, kde je regulace porostu nežádoucí
  - registrace proti alternáriové skvrnitosti brukvovitých a hlízence obecné
  - dávka 0,5 l/ha od 60 BBCH do 65 BBCH, max. 1x
  - vynikající partner do TM směsí s ostatními fungicidy (Chamane, Metfin, Ornament 250 EW, Probus, ...)

Chamane

Účinné látky: 250 g/l azoxystrobin

- Přednosti:**
- unikátní místo působení – mitochondrie
  - obsahuje strobilurin – „Green efekt“ – přináší více asimilátů, vyšší výnos a kvalitu
  - vynikající partner do TM směsí s ostatními fungicidy
  - registrace proti hlízence obecné a černím v dávce 1,0 l/ha



Metfin

Účinná látka: 60 g/l metkonazol

- Přednosti:**
- preventivní aplikace – dlouhodobé působení proti širokému spektru chorob
  - registrace proti fomové hnilobě a fomovému černání krčku v dávce 1,2–1,5 l/ha
  - v jarní řepce registrován proti hlízence obecné (1,5 l/ha)
  - vynikající partner do TM směsí s ostatními fungicidy

Ornament 250 EW

Účinná látka: 250 g/l tebukonazol

- Přednosti:**
- ochrana řepky olejky proti houbovým chorobám (fomová hniloba, hlízenka obecná, čerň řepková) v dávce 1–1,5 l/ha s výrazným vedlejším účinkem proti dalším chorobám (cylindrosporium, plíseň šedá, padlí, apod.)
  - již od 0,5 l/ha morforegulační účinek
  - podzimní aplikace – foma, morforegulace
  - jarní aplikace – hlízenka, černě, morforegulace

Probus

Účinné látky: 250 g/l prothiokonazol

- Přednosti:**
- azol nové generace
  - systémový, širokospektrý fungicid s preventivním i kurativním účinkem
  - registrován do řepky olejky v dávce 0,7 l/ha proti hlízence obecné
  - dlouhodobý účinek proti houbovým chorobám
  - vynikající partner do TM směsí (Chamane, Ornament 250 EW)

Protebo

Účinné látky: 125 g/l prothiokonazol  
125 g/l tebukonazol

- Přednosti:**
- ready mix dvou azolů
  - systémový, širokospektrý fungicid s preventivním i kurativním účinkem
  - registrován do řepky olejky a hořčice v dávce 0,75–1,0 l/ha (fómová hniloba) na podzim i na jaře, a v dávce 0,75 l/ha (hlízenka obecná)
  - působí na velice široké spektrum chorob



Alicuprin

**Složení:** Celková měď (Cu) 377,5 g/l, tj. 25 % hmotnostních

- Doporučení:**
- 0,4–2,1 l/ha během vegetace, max. do 4 týdnů před sklizní
  - preventivně i k odstranění akutního deficitu mědi

Wuxal Microplant

**Složení:** 75 g/l N, 150 g/l K<sub>2</sub>O, 45 g/l MgO 4,5 g/l B; 7,5 g/l Cu; 15 g/l Fe; 22,5 g/l Mn; 0,15 g/l Mo; 15 g/l Zn a 78 g/l S

- Doporučení:**
- preventivně i k odstranění akutního deficitu mikroprvků; 1–2x dávka 1–2 l/ha; aplikace v období před květem



Wuxal Boron Plus

**Složení:** 5% N, 13% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 7,7% B; Stopové prvky – Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

- Doporučení:**
- dávkování 1,0–2,0 l/ha
  - 2 aplikace za vegetaci
  - obsahuje nová aditiva – technologie „Xtra Uptake“ – vysoce účinný systém příjmu živin rostlinami

Wuxal Oilseed

**Složení:** 84 g/l B, 70 g/l Mn, 3,5 g/l Mo, 105 g/l SO<sub>3</sub>

- Doporučení:**
- obsažené mikroelementy odstraňují akutní i latentní deficit v rostlinách (zvyšují mrazuvzdornost, zlepšují nasazení šesulí a redukují jejich opad) a zvyšují kvalitu finální produkce (obsah oleje v semenech)
  - 1. aplikace během vývoje listové růžice (podzimní aplikace ve fázi 4–6 pravých listů ozimé řepky)
  - 2. aplikace během prodlužovacího růstu
  - 3. aplikace na počátku kvetení aplikujeme současně s běžně používanými přípravky na ochranu rostlin v dávce 2 l/ha

Apiflex

**Účinná látka:** 200 g/l acetamiprid

- Přednosti:**
- systémový insekticid na bázi neonikotinoidu
  - registrace do ozimé řepky olejky proti blýskáčkům, krytonosci šešulovému a bejlomorce kapustové v dávce 120–250 ml/ha
  - registrace proti krytonosci čtyřzubému 250–300 ml/ha
  - **BEZ OMEZENÍ PRO VČELY**

Ironmax Pro

**Účinná látka:** 24,2 g/l fosforečnan železitý

- Přednosti:**
- ekologický přípravek srovnatelný účinností s produkty na bázi metaldehydu
  - vysoce odolný vlhku a dešťovým srážkám
  - atraktivní požerová návnada pro slimáky
  - bezproblémová aplikace v dávce 7 kg/ha

Scatto

**Účinná látka:** 25 g/l deltamethrin

- Přednosti:**
- ochrana řepky proti široké škále škůdců – blýskáček, krytonosci, dřepčík olejkový v dávce 0,2 l/ha
  - fotostabilní syntetický pyrethroid – působí jako kontaktní požerový jed
  - výborný partner do TM směsí s dalšími přípravky na ochranu rostlin
  - výhodná cena hektarového ošetření



Tamer

NOVINKA

**Účinná látka:** 200 g/l acetamiprid

- Přednosti:**
- systémový insekticid na bázi neonikotinoidu
  - registrace v řepce proti blýskáčkům, krytonosci čtyřzubému, řepkovému a šešulovému a bejlomorce kapustové v dávce 200 ml/ha
  - registrace proti dřepčíku olejkovému 200 ml/ha na podzim

Metarex Inov

**Účinná látka:** 40 g/kg metaldehyd

- Přednosti:**
- aplikace po zasetí při vzcházení
  - vysoce odolný vlhku a dešťovým srážkám
  - atraktivní požerová návnada pro slimáky
  - bezprašné granule vhodné k rozmetání

Ravane

**Účinná látka:** 50 g/l lambda-cyhalothrin

- Přednosti:**
- registrovaná dávka 0,15 l/ha proti blýskáčkům, dřepčíkům, krytonosci šešulovému a bejlomorce kapustové
  - světlostabilní pyretroid s dotykovým požerovým účinkem
  - spolehlivý hmyzohubný účinek i při nízkých teplotách
  - **BEZPEČNÝ PRO VČELY!**





## Designer

**Účinné látky:** 255 g/l syntetický latex

**Přednosti:**

- smáčedlo pro použití s fungicidy a insekticidy v dávce 0,1 l/ha
- snižuje ztráty smyvem, úletem
- zvyšuje přilnavost a zadržení postřikové jichy

## Gondor

**Účinné látky:** 495 g/l lecitin

**Přednosti:**

- smáčedlo pro použití s herbicidy v dávce 0,25 l/ha
- snižuje ztráty úletem
- zvyšuje přilnavost, penetraci, translokaci

## Eutrofit

**Účinné látky:** sušená býčí krev

**Přednosti:**

- registrace do řepky, pšenice, ječmene a ovsa v dávce 7–10 kg/ha
- stimuluje fotosyntézu a tvorbu chlorofylu
- v poloprovozních pokusech byl zjištěn **repelentní účinek na divokou zvěř !**
- výborný partner do TM směsí s přípravky na ochranu rostlin

## Celstar 750 SL

**Účinná látka:** 750 g/l chlormekvát

**Přednosti:**

- registrace do ozimé řepky olejky k regulaci růstu a zvýšení jistoty přezimování
- dle účelu použití se aplikuje 0,5–0,75 l/ha od 14 BBCH do 16 BBCH
- vynikající partner do TM směsí s dalšími přípravky na ochranu rostlin (Ornament 250 EW, ...)

## Alitrin

**Účinná látka:** 250 g/l trinexapak-ethyl

**Přednosti:**

- zvyšuje odolnost vůči poléhání
- dávka 1,5 l/ha od BBCH 39 do BBCH 55
- vynikající partner do TM směsí s ostatními přípravky na ochranu a listovými hnojivy



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.