

Mg85S

Síran hořečnatý – roztok

Dovozce/dodavatel: AGRO ALIANCE s.r.o. 252 26 Třebotov 304, tel.: 257 830 138**Výrobce :** AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, Francie.
www.agronutrition.fr**Číslo ohlášení:** O737**Číslo typu:** 4.7**Chemické a fyzikální vlastnosti:**

Vlastnost	Hodnota
Vodorozpuštěný oxid hořečnatý (MgO) (85 g/l) v %	6,0
Vodorozpuštěný síranový aniont (SO ₄) (167 g/l) v %	13,0

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limitní hodnoty (v mg/kg hnojiva):
kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 50.**Rozsah a způsob použití:**

Pro dosažení co nejlepších výsledků, použijte dostatečné množství (aplikujte do skanutí). Neaplikujte v době silného slunečního záření anebo vysokých teplot vzduchu. Pokud je to možné aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy nejvyšší denní teplota překročí 28° C. Velmi mladé listy a plodiny ve stresu mohou být náchylnější ke spálení (za těchto okolností používejte nižší dávky a přiměřeně zredukujte aplikační interval). Viz doporučení aplikační dávky a aplikační termíny uvedené na této etiketě pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovní použití.

Příprava aplikační kapaliny

1. Nádrž postřikovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení.
2. Přidejte potřebné množství hnojiva, a poté přidejte zbytek vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Při kombinaci s dalšími složkami v tank-mix, tento produkt přidávejte vždy jako poslední. Neponechávejte směs stát bez zapnutého míchacího zařízení.
3. Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřikovací zařízení.

Doporučené dávkování:

Doporučujeme listovou aplikaci.

plodina	dávka	poznámka
Řepka olejka	2 – 4 l/ha min. 200 l vody/ha.	1 aplikace na začátku dlouhivého růstu. V případě deficitu 2 aplikace ve stadiu 4 až 6 listů a na začátku dlouhivého růstu. Neaplikovat v době květu. Lze po odkvětu.
Obiloviny	2 – 4 l/ha min. 200 l vody/ha	Podzim - 1 aplikace v stadiu 2 – 3 listy Jaro – 1 – 2 aplikace do konce odnožování
Kukuřice	2 – 4 l/ha min. 200 l vody/ha	1 aplikace v stadiu 4 až 6 listů
Brambory	3 – 4 l/ha	1 – 2 aplikace po plném zapojení porostu
Cukrová řepa	2 – 4 l/ha min. 200 l vody/ha	1 – 2 aplikace ve stadiu 4 – 6 listů
Zelenina	3 - 4 l/ha min. 150 l vody/ha	1 až 2 aplikace v 10 - 14 denních intervalech na dobře založený porost
Vinná réva	4 - 8 l/ha min. 200 l vody/ha	2 až 3 aplikace před a po kvetení, potom 3 - 4 aplikace po uzavírání hroznů
Ovocné stromy	4 - 6 l/ha min. 150 l vody/ha	3 - 4 aplikace od opadu okvětních lístků a potom každých 10 - 15 dní

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv, gumové nebo plastové rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte páry/aerosoly. Po práci si omyjte ruce a obličej.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Podmínky skladování

Uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřené, na bezpečném místě mimo dosahu dětí, zvířat a potravin. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

Likvidace

Nevylévejte do kanalizace. Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Kontejner po vyprázdnění tři krát vypláchněte. Výplachovou vodu použijte k přípravě aplikační směsi. Prázdné obaly předejte do sběru k recyklaci. Kontejner nepoužívejte k jiným účelům.

Hnojivo se dodává balené.

Hmotnost (objem) balení: 12,3 kg (10 L)

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

Datum výroby:

Číslo výrobní šarže:

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.