

FLOTYN[®] 114 OD

Zloženie: Florasulam 10 g.l⁻¹, Nicosulfuron 80 g.l⁻¹, Thifensulfuron-methyl 24 g.l⁻¹

Selektívny systémový herbicíd určený na aplikáciu na listy, vo forme suspenzného koncentráту na báze oleja (OD), pre použitie do kukurice proti dvojklíčnolistovým burinám a trávam.

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

Herbicíd obsahuje tri účinné látky klasifikované ako inhibitory acetolaktát syntetázy (ALS), ktoré blokujú biosyntézu aminokyselín s rozvetveným refazcom, a tým narúšajú biosyntézu bielkovín, v dôsledku čoho brzdia vývoj a rast burín.

Prípravok je prijímaný hlavne listami a koreňmi a následne je rýchlo translokovaný v rastline. Prvé účinky sú viditeľné 4 – 5 dní po skončení ošetrovania. Buriny úplne odumierajú 6 – 8 dní po ošetrovaní.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI:

Citlivé buriny: ježatka kuria, hviezdica prostredná, mrlík biely, pýr plazivý, lipkavec obyčajný, ľuľok čierny, horčiak broskyňolistý, horčiak štiavolistý, pohánkovec ovijavý, ruman roľný, výmrav repky, láskavec ohnutý, kapsička pastierska, žltica maloubovorová.

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

PLODINA	ÚČEL POUŽITIA	DÁVKA l.ha ⁻¹	OCHRANNÁ DOBA	POZNÁMKA
Kukurica	dvojklíčnolistové buriny a trávy	0,5 l	AT	

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-300 l/ha.

Maximálny počet ošetrovaní za vegetačné obdobie: 1x

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento prípravok viac ako 1 x za 2 roky na tom istom pozemku.

Odporúčané postrekovanie: kvapky strednej veľkosti

Termín aplikácie: prípravok aplikujte po vzídení burín, vo fáze 2-4 listov kukurice (BBCH 12-14).

Prípravok je najúčinnjší proti mladým, dynamicky rastúcim dvojklíčnolistovým burinám vo fáze 2 až 4 listov (BBCH 12-14) a proti jednoklíčnolistovým burinám vo fáze 3 až 5 listov (BBCH 13-15).

Zrážky skôr ako 4 hodiny po aplikácii môžu znížiť účinnosť prípravku.

Upozornenie

V nepriaznivých poveternostných podmienkach (napr. sucho, silné zrážky bezprostredne po zákroku, nízke alebo vysoké teploty, veľké teplotné výkyvy medzi nocou a dňom) u niektorých odrôd kukurice môže látka spôsobiť prechodné fytotoxické symptómy, ktoré neovplyvňujú plodinu.

Prípravok nepoužívajte do kukurice cukrovej, pukancovej a pri plemenných materiáloch (samčie a samičie línie atď.), na rastliny v strese, oslabené alebo poškodené mrazom, suchom, záplavami, záhybmi, škodcami alebo chorobami, pri nerovnomernom klíčení, listových hnojivách a stimulátoroch rastu, okamžite po období dlhého chladného počasia, na rastlinách, ktorých rast bol spomalený v dôsledku nízkych teplôt, na rastliny mokré, na rastliny so symptómami fytotoxicity po predchádzajúcom použití pesticidov alebo v dôsledku zvyškov pesticidov v pôde, pri teplote vzduchu nižšej ako 10°C a vyššej ako 25°C, pri listových hnojivách a stimulátoroch rastu.

Upozornenie

Prípravok sa v priebehu vegetačného obdobia v pôde rozloží na úroveň, ktorá nepredstavuje hrozbu pre následné plodiny.

Pokiaľ je potrebné ošetrovať porast predčasne zaorať, tak ako náhradnú plodinu je možné vysievať po jednom mesiaci kukuricu a ozimné obilniny po 4 mesiacoch.

Na jar nasledujúceho roku možno pestovať všetky plodiny. Pri aplikácii zabráňte prekryvaniu postrekových pásov, vrátane úvratí. Zabráňte zasiahnutiu susedných plodín postrekovou kvapalinou!

Balenie: 5 l kanister