

CEREFOL® MULTI

CE HNOJIVO

Suspensia hnojiva N, MgO (3,4-15,9) s mikroživinami meď (Cu, uhličitan), mangán (Mn, uhličitan) a zinok (Zn, oxid).

Zloženie: celkový dusík (N) močovínový 55 g.l⁻¹, oxid horečnatý (MgO) 260 g.l⁻¹, meď (Cu) vo forme uhličitanu 50 g.l⁻¹, mangán (Mn) vo forme uhličitanu 130 g.l⁻¹, zinok (Zn) vo forme oxidu 80 g.l⁻¹.

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

PLODINA	DÁVKA l.ha ⁻¹	POZNÁMKA
obilniny	1-2 l/ha	jedna aplikácia od 2 listov do fázy prvého kolienka. Opakovať v prípade potreby (vážneho nedostatku).
kukurica	1-2 l/ha	jedna aplikácia vo fáze od 4 - 8 listov
fazuľa (na zeleno)	2 l/ha	jedna aplikácia vo fáze od 4 - 6 listov
zelenina (cesnak, cibuľa, mrkva, pór, artičoka, špenát)	2 l/ha	delená aplikácia
trávne porasty (pasienky)	2 l/ha	aplikácia na jar po obnovení vegetácie. V prípade silného nedostatku opakovať aplikáciu po 14 dňoch
lúky (siláž / seno)	2 l/ha	aplikujte 15 až 21 dní pred kosením

Najlepšie výsledky sa dosiahnu rovnomerným pokrytím plodín postrekom až do stečenia. Neaplikujte pri vysokých teplotách a silnom slnečnom svite. Ak je to možné, aplikujte večer alebo skoro ráno, najmä ak denné teploty prekračujú 28 °C. Pri aplikácii na mladé listy alebo rastliny v strese používajte nižšie dávky, zodpovedajúcim spôsobom znížte interval aplikácie.

Upozornenie

Použiť len v prípade skutočnej potreby. Neprekročiť dávkovanie 1-2 l/ha.
Listová aplikácia: Dávka: 1 - 2 l/ha, maximálna koncentrácia: 1.5 %.

Príprava aplikačnej kvapaliny:

1. Nádrž postrekača naplňte vodou do polovice požadovaného množstva vody a spustite miešanie.
2. Pridajte požadované množstvo CEREFOL Multi a doplňte zvyšok vody. Miešanie ponechajte stále zapnuté. Pri kombinovaní s ostatnými komponentmi v nádrži, CEREFOL Multi pridajte po práškovom hnojive. Presvedčte sa že miešanie je stále zapnuté.
3. Po postreku, postrekovacie zariadenie vyčistite a opláchnite.

Balenie: 5 l kanister