

ALNICO®

Účinná látka: nicosulfuron 40 g.l⁻¹

Herbicídny prípravok na ochranu rastlín vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD) na ničenie dvojklíčnolistových burín a ježatky kurej v kukurici.

PÔSOBNIE PRÍPRAVKU

ALNICO® je neselektívny herbicíd so systemovým účinkom, prijímaný hlavne listmi, rýchle sa v rastline premiestňuje a brzdí ich rast a vývoj. Rast burín je zbrzdený krátko po aplikácii prípravku, kedy dochádza k postupnému odfarbovaniu rastlín. Buriny odumierajú po 20 - 25 dňoch od ošetrenia. Prípravok účinkuje neefektívnejšie na mladé, intenzívne rastúce buriny vo fáze 2-4 listov (dvojklíčnolistové buriny) alebo od fázy 3 listov do konca fázy odnožovania (jednoklíčnolistové buriny). Teplé a vlhké počasie urýchľuje účinkovanie prípravku, suché počasie môže spomaliť účinok.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, kapsička pastierska

Stredne citlivé buriny: ježatka kuria, parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný

Odolné buriny: fialka poľná, mrlík biely, pohánkovec ovijavý

NÁVOD NA POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL'	DÁVKA l.ha ⁻¹	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria	1,0 l	AT	na zrno, na siláž

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Kukurica

Dávka vody: 200 - 300 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1 ×

Prípravok aplikujte po vyklíčení kukurice od fázy 2. do konca fázy 7. pravého listu (BBCH 12-17).

Aplikujte na mladé, intenzívne rastúce buriny vo fáze 2 - 4 listov (dvojklíčnolistové buriny) alebo od fázy 3 listov do konca fázy odnožovania (jednoklíčnolistové buriny).

Prípravok je určený k aplikácii pomocou samohybných alebo traktorových poľných postrekovačov. Odporúčany spôsob postreku: stredne veľké kvapky.

Prípravok neaplikujte:

- do kukurice cukrovej, kukurice pukancovej a pri produkcii pestovateľských materiálov,
- bezprostredne po období dlhodobého chladu v plodinách, ktorých rast bol zabrzdený následkom nízkyh teplôt; ošetrovanie môžete vykonať po tom, čo sa rast obnoví,

- v intenzívnom raste kukurice,
- pri teplote vzduchu pod 10° C a nad 25° C,
- na rastliny oslabené a poškodené mrazom, suchom, škodcami alebo chorobami,
- na mokré rastliny (rosa, dážď).

Upozornenie

V prípade, že je potrebné predčasne zlikvidovať pole ošetrené prípravkom (následkom poškodenia rastlín mrazom, chorobami alebo škodcami), je možné 30 dní po vykonaní predsejbovej úpravy opäť pestovať kukuricu alebo:

- obilniny – po 3 mesiacoch – na kyslých pôdach; po 9 mesiacoch – na neutrálnych a zásaditých pôdach,
- strukoviny – po 9 mesiacoch,
- lucernu – po 12 mesiacoch.

Na jar nasledujúceho roku je možné pestovať všetky plodiny.

Balenie: 5 l kanister