

VIVENDI® 600

Účinná látka: Clopyralid 600 g.l⁻¹ vo forme Clopyralid-dimethylamine v obsahu 741 g.l⁻¹

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v poľnohospodárskych plodinách a v okrasných drevinách a kríkoch.

PÔSOBNIE PRÍPRAVKU

Prípravok VIVENDI® 600 pôsobí ako systémový rastový herbicíd, preniká do rastlín cez listy a byle. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu (dekolorácia), následne sa objavuje krútenie listov a stoniek (deformácia) a v priebehu 10-21 dní hynú. Prvé symptómy sú viditeľné pri optimálnych podmienkach za 3-6 dní po aplikácii prípravku VIVENDI® 600. Účinná látka clopyralid sa v pôde rýchlo rozkladá vplyvom činnosti mikroorganizmov.

SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

Citlivé buriny: chryzantémovka siatinová, pichliač roľný, starček obyčajný, rumaček diskovitý, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, mlieč zelinový.

Stredne citlivé buriny: pohánkovec ovijavý, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný.

NÁVOD NA POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL'	DÁVKA l.ha ⁻¹	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,12 l	AT	1 postreková aplikácia
repa cukrová, repa krmná, mangold	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,17 l	32 dní	
	pichliač a trváce buriny	T1: 0,17 l T2: 0,33 l		
lúky a pasienky	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,33 l	7 dní	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA l.ha ⁻¹	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repka ozimná, repka jará	pichliač a trváce buriny	0,33 l	AT	len jará aplikácia
	pichliač a trváce buriny	T1: 0,17 l T2: 0,33 l		
okrasné dreviny a kry	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,33 l	AT	
kvaka, okružlica	jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,17 l	AT	
	pichliač a trváce buriny	T1: 0,17 l T2: 0,33 l		

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Aplikácie s prípravkom VIVENDI 600 nesmú byť robené pred 1. marcom.

Maximálny počet aplikácií: 2 x za sezónu (pri aplikácii na obilniny a na lúky a pasienky raz).

Len jará aplikácia!

V obilninách aplikujte prípravok VIVENDI 600 na jar, v rastovej fáze od dvoch pravých listov (BBCH 12 v prípade jarín) do rastovej fázy druhého kolienka (BBCH 32). Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,12 l.ha⁻¹. Dávka vody 200 l.ha⁻¹.

V repe cukrovej, repe krmnej a mangolde aplikujte proti jednoročným burinám VIVENDI 600 v dávke 0,17 l.ha⁻¹ od rastovej fázy dvoch pravých listov ošetrovanej plodiny do zapojenia porastu (BBCH 12-39). Na ničenie pichliača použite delenú aplikáciu CLIOPHAR® 600 SL a to v T₁ dávku 0,17 l.ha⁻¹ v rastovom štádiu ružice a v T₂ dávku 0,33 l.ha⁻¹. Minimálny časový odstup medzi dvoma aplikáciami je 7 dní. Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,5 l.ha⁻¹. Dávka vody 200-250 l.ha⁻¹.

V repe ozimnej a repke jarnej aplikujte prípravok VIVENDI 600 na jar od rastovej fázy dvoch pravých listov (BBCH 12) najneskôr však do predĺženia 9. alebo ďalšieho internódia (BBCH 39). Dávku 0,17 l.ha⁻¹ použite na ničenie rumančekovitých burín (rastové štádium prízemná ružica o priemere do 10 cm). Dávku 0,33 l.ha⁻¹ použite na ničenie pichliača (rastové štádium prízemná ružica o priemere do 30 cm). Prípadne je možné použiť delenú aplikáciu, pričom časový odstup medzi aplikáciami je minimálne 7 dní. Celoročná dávka nesmie prekročiť 0,5 l.ha⁻¹. Dávka vody 200 l.ha⁻¹.

Pri ošetrovaní okrasných drevín a krov použite ochranný kryt, aby ste zabránili priamemu kontaktu postreku so zelenými časťami (listy, stonky, kvetné pupene) ošetrovaných rastlín. Nepostrekujte v blízkosti rastlín z čeľadi astrovitých a bôbovitých z dôvodu citlivosti koreňov na účinnú látku prípravku. Celoročná dávka nesmie prekročiť 0,33 l.ha⁻¹. Dávka vody 200 l.ha⁻¹.

Na lúkach a pasienkoch je možné aplikovať VIVENDI 600 na všetky druhy a odrody tráv v dávke 0,33 l.ha⁻¹. Ošetríte vo fáze 2-4 pravých listov dvojkličnolistových burín v čase ich aktívneho rastu. Pichliač by mal byť v rastovej fáze prízemnej ružice (priemer 30 cm). V prípade kosby, postrekujte 2-3 týždne po kosbe, aby buriny mali vytvorenú listovú plochu. Medzi aplikáciou prípravku a spásaním porastu alebo jeho skosením na priame kŕmenie, výrobu sena,

senážovanie musí uplynúť minimálne 7 dní. Pred spásaním sa uistite, že jedovaté rastliny sú odumreté! Celoročná dávka nesmie prekročiť $0,33 \text{ l} \cdot \text{ha}^{-1}$. Dávka vody $300\text{--}400 \text{ l} \cdot \text{ha}^{-1}$.

V kvake a okružlici aplikujte prípravok VIVENDI 600 na jar od rastovej fázy dvoch pravých listov (BBCH 12) najneskôr však do predĺženia 9. alebo ďalšieho internódia (BBCH 39). Dávku $0,17 \text{ l} \cdot \text{ha}^{-1}$ použite na ničenie rumančekovitých burín (rastové štádium prízemná ružica o priemere do 10 cm). Na ničenie pichliača použite delenú aplikáciu CLIOPHAR® 600 SL a to v T1 dávku $0,17 \text{ l} \cdot \text{ha}^{-1}$ v rastovom štádiu ružice a v T2 dávku $0,33 \text{ l} \cdot \text{ha}^{-1}$. Minimálny časový odstup medzi dvoma aplikáciami je 7 dní. Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť $0,5 \text{ l} \cdot \text{ha}^{-1}$. Dávka vody $200\text{--}250 \text{ l} \cdot \text{ha}^{-1}$.

Rastliny ošetrované s prípravkom VIVENDI 600 nepoužívajte na mulčovanie (s výnimkou použitia v jahodách), kompostovanie podstielky alebo ako substrát pre pestovanie húb. Maštalný hnoj od zvierat kŕmených ošetrovanou plodinou nepoužívajte na kompostovanie.

POUŽITIE PRÍPRAVKU V SEMENNÝCH PORASTOCH KONZULTUJTE S DRŽITEĽOM AUTORIZÁCIE!

Prípravok neaplikujte pri teplote vyššej než $+23^{\circ}\text{C}$. Neošetrujte ak je porast stresovaný chladom, poškodený škodcami, trpí nedostatkom výživy a pod.

Upozornenie

Obilniny, kukurica a plodiny z čeľade kapustovitých môžu byť siate hneď po aplikácii prípravku. Ostatné dvojklíčnolistové plodiny nemôžu byť vysievané skôr ako po 9 mesiacoch od poslednej aplikácie. Niektoré plodiny ako napríklad zemiak, slnečnica, rajčiak, paprika, cuketa, strukoviny (soja, hrach, ...) sú zvlášť citlivé na rezíduá účinnej látky. Ubezpečte sa, že všetky rezíduá sú rozložené. Pozberové zvyšky zapracujte čo najsôr do pôdy.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace porasty! Mimoriadne citlivé sú lucerna, ďatelina, ovocné sady, vinič a chmeľ. V blízkosti týchto plodín ošetrujte len pri vhodných podmienkach (bezvetrie, nižšie teploty).

Balenie:

$0,1 \text{ l}$, $0,25 \text{ l}$, $0,5 \text{ l}$ a 1 l HDPE/EVOH fľaša 1 l HDPE fľaša a 5 l HDPE kanister;
 $0,5 \text{ l}$, 1 l a 5 l PET fľaša