



Sója ochrana a listová výživa

Prípravky firmy Agro Aliance SK

**Šetríme Vaše
peniaze!**

S VAMI, PRE VÁS

Evolution

Clethodim 140 g.l⁻¹


Quizalofop-P-ethyl 70 g.l⁻¹

- unikátne zloženie dvoch účinných látok
- systémový selektívny herbicíd pre postemergentné ošetrovanie, vo forme EC
- proti jednoročným aj trváčim trávovitým burinám a výmrvu obilnín
- bez reziduálnej účinnosti
- po aplikácii je účinná látka rýchlo prijímaná a transponovaná do koreňového systému a nadzemných častí rastliny
- aplikujeme so zmáčadlom na báze esterifikovaného rastlinného oleja (napr. ISTROEKOL)
- optimálny termín aplikácie je od 3 listov do začiatku odnožovania trávovitých burín
- dávka od 0,35 – 0,5 (1) l.ha⁻¹ – výmrv, 0,75 – 1 (1) l.ha⁻¹ – trváce trávy, 1 (1) l.ha⁻¹ – odolné jednoročné trávy
- (TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného oleja (Istroekol)
- dávka vody 200 – 400 l.ha⁻¹

Pendiflex 400

Pendhimetalin 400 g.l⁻¹

- pôdny herbicíd s dlhodobým účinkom proti širokému spektru dvojklíčnolistových a jednoklíčnolistových burín, s vynikajúcou selektivitou voči sóji
- vhodný na preemergentnú aplikáciu v dávke 3,3 až 4 l.ha⁻¹ vo vyššej dávke aplikačnej vody, vďaka za dobre pripravenú pôdu s čiastočnou vlhkosťou, primerané zrážky po postreku herbicídom zlepšujú účinnosť



Ironmax Pro

Fosforečnan železitý 24,2 g.kg⁻¹

- prípravok vo forme návnady pripravenej na použitie, určený na reguláciu slizniakov
- preventívna aplikácia v dávke 7 kg.ha⁻¹
- aplikáciu opakujeme podľa potreby maximálne 4x za rok
- mŕtve slizniaky nie je vidieť, stiahnu sa pod povrch pôdy, kde uhynú
- vynikajúca formulácia odolná voči dažďu

Gondor

Lecitin 495 g.l⁻¹

- adjuvant pre použitie v zmesi s herbicídmi a regulátormi rastu
- registrácia vo všetkých plodinách, na ornej, lesnej a nepoľn. pôde vrátane železníc
- zvyšuje príľnavosť a rozprestretie postrekovej zmesi
- zvyšuje penetráciu a translokáciu aplikovaných pesticídov
- znižuje nežiaduci úlet pri aplikácii postrekovej zmesi
- dávka 0,25-0,4 l.ha⁻¹, (max konc. 0,25 %)
- dávka vody: 100-200 l.ha⁻¹ pri dávke 0,25 l.ha⁻¹ nad 200 l.ha⁻¹ pri dávke 0,4 l.ha⁻¹
- **pri príprave postrekovej zmesi dávajte adjuvant prvý**

Elastiq Gold

Karbox. styren butadien kopolymér 455,5 g.l⁻¹

- po aplikácii prípravku sa na povrchu vytvára polymérna polopriepustná membrána
- obmedzuje praskanie šesúľ a vypadávanie semien, znižuje predzberové a zberové straty
- k polymerizácii nie je potrebné denné svetlo
- registrácia na zníženie predzberových a zberových strát 0,5-1,0 l.ha⁻¹
- aplikácia 3-4 týždne pred očakávaným zberom (šešule ohnúť do tvaru „V“ bez prasknutia)
- množstvo vody pri pozemnej aplikácii 300-500 l.ha⁻¹, pri leteckej 60-80 l.ha⁻¹

Silwet Gold

Polyalkyleneoxid heptamethyl trisiloxane (80 %)

Allyloxypolyethyleneglycol (20 %)

- neiónové organosilikónové zmáčadlo s vysokoúčinnou schopnosťou znížiť povrchové napätie postrekovej kvapaliny
- zabezpečuje rovnomerné rozptýlenie postreku
- rýchly prienik do rastliny
- mimoriadne bezpečný pre rastliny
- najbežnejšia dávka je 0,1 l.ha⁻¹, (povolená od 0,025 do 0,15 l.ha⁻¹)



Eutrofit



Zloženie: N v organickej forme 3,7 %, Fe min. 600 ppm

- aplikujeme na vzídený porast v jesennom období a na jar hneď ako je to možné
- prípravok má výrazné repelentné účinky na poľnú zver (ochrana vzídených porastov pred požermi)
- opakované aplikácie v priebehu 14-21 dní v závislosti na priebehu počasia
- celoplošné ošetrovanie porastov nie je nutné, ošetrujeme len okraje porastov (1 až 2 zábery postrekovačom)

Fixa Mn



Zloženie: Mn 120 g.l⁻¹, SO₃ 170 g.l⁻¹

- mangán synergicky pôsobí na lepšie využitie zinku, bóru a ostatných mikroelementov
- hnojivo v dávke 1 až 2 l.ha⁻¹ výborne dopĺňa výživové kombinácie zinku, bóru a síry, ktoré sú osvedčené pri aplikáciách od 4 do 8 listu porastov sóje a zabezpečujú nárast počtu zŕn v struku

Boronia Mo6

Zloženie: N 60 g.l⁻¹; B 120 g.l⁻¹; Mo 6,0 g.l⁻¹

- hnojivo špeciálne navrhnuté pre potreby olejní
- vysoko koncentrovaný kvapalný koncentrát, ktorý rieši nedostatok bóru, molybdénu a mangánu v poľných plodinách
- z mikroelementov má sója vysoké požiadavky hlavne na molybdén
- Molybdén (Mo) má výrazný vplyv na fixáciu vzdušného dusíka

Boronia



Zloženie: Bór 150 g.l⁻¹

- nedostatok bóru, často v dôsledku nevhodnej pôdnej reakcie možno doplniť aplikáciou kvapalných hnojív
- efekt hnojenia na list je za vysokých teplôt a nízkej vzdušnej vlhkosti veľmi nízky, vhodné podmienky pre príjem živín je vysoká vzdušná vlhkosť a zamračené počasie, prípadne nočné aplikácie



Táto publikácia má informatívny charakter. Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Poradenstvo



Ing. Miroslav Bohunický
mobil: 00421 918 491 743
e-mail: m.bohunicky@agroalliance.sk

Ing. Ján Gajdoš
mobil: 0915 781 289
e-mail: j.gajdos@agroalliance.sk

Andrea HAJDÚKOVÁ
mobil: 0905 526 442
e-mail: a.hajdukova@agroalliance.sk

Ing. Boris Vladovič
mobil: 0917 881 042
e-mail: b.vladovic@agroalliance.sk