



Evolution®

Protebo®

Tamer®

Tebuflex® 500

Wuxal® Boron Plus

Repka ozimná
ochrana a listová výživa

Prípravky firmy Agro Aliance SK

**Šetríme Vaše
peniaze!**

S VAMI, PRE VÁS

Devrinol 45 F

Napropamide 450 g.l⁻¹

- registrácia pre repku, papriku a výsadby rajčín
- spoľahlivo ničí rumančekovité buriny, mak vlčí, peniažtek, mrľiky, hviezdicu prostrednú, metličku obyčajnú a ďalšie jednokl. aj dvojk. buriny
- najšetrnejší herbicíd ku všetkým odrodám repky
- dávka 2,5 l.ha⁻¹

Kaput New

Glyphosate 180 g.l⁻¹

- systémový neselektívny herbicíd, určený na ničenie širokého spektra jednoročných a trvácich dvojkličnolistových burín a tráv v kukurici, na nepoľnohospodárskej pôde, na strnisku a v jadrovinách
- patentovaná BGT® technológia („Better Glyphosate Technology“) umožňuje znížiť dávku účinnej látky (glyphosate) na polovicu pri zachovaní rovnakej účinnosti
- dávka 1,5 – 6,0 l.ha⁻¹
- maximálny počet aplikácií: 1x za vegetáciu
- nižšia dávka vody (100–150 l.ha⁻¹) zvyšuje účinnosť prípravku

Protebo

125 g.l⁻¹ prothioconazole; 125 g.l⁻¹ tebuconazole

- kombinácia vhodne sa dopĺňajúcich plne systémových fungicídnych účinných látok dosahujúcich vynikajúce výsledky v boji proti chorobám repky
- v repke ozimnej aplikácia dávky 0,75 l.ha⁻¹ v čase plného kvitnutia poskytuje výbornú ochranu proti bielej hnilobe a černej repkovej
- proti fómovej hnilobe je potrebné aplikovať na začiatku opadu kvetných lupienkov
- (BBCH 62), proti černej a proti botrytíde pri prvých príznakoch, najneskôr vo fáze BBCH 67
- možné TM použiť s insekticídmi Apiflex, Delta a Scatto
- použitie zmáčadla Silwet Gold výrazne zvyšuje účinnosť

Maganic

prothioconazole 175 g.l⁻¹ a Difenoconazole 125 g.l⁻¹

Systémovo pôsobiaci fungicíd na ochranu repky proti fómovej hnilobe v dávke 0,8–1,0 l.ha⁻¹

- Prípravok má preventívny a aj kuratívny účinok proti širokému spektru hubových patogénov
- Prothioconazol pôsobí stimulačne čím podporuje zvýšenie úrody
- V repke olejnej ozimnej aj jarnej treba aplikovať preventívne alebo ihneď pri zistení príznakov od fázy 4 listov do začiatku tvorby bočných výhonkov BBCH 14 – 20

! VÝHODNÁ CENA !

Devrinol 45 F + Boa 360 CS (clomazone 360 g.l⁻¹)

- aplikuje sa preemergentne, do 3 dní po sejbe, bez zapravenia
- posilnený a predĺžený pôdny účinok na všetky buriny i v prípade suchej jesene
- Využite náš balíček na 20 ha (DEVIRINOL 2,25 l + BOA 0,15 l.ha⁻¹)

Evolution

Clethodim 140 g.l⁻¹

Quizalofop-P-ethyl 70 g.l⁻¹

- unikátne zloženie dvoch účinných látok
- systémový selektívny herbicíd pre postemergentné ošetrovanie, vo forme EC
- proti jednoročným aj trvácim trávovitým burinám a výmrvu obilnín
- bez reziduálnej účinnosti
- po aplikácii je účinná látka rýchlo prijímaná a transponovaná do koreňového systému a nadzemných častí rastliny
- aplikujeme so zmáčadlom na báze esterifikovaného rastlinného oleja (napr. ISTROEKOL)
- optimálny termín aplikácie je od 3 listov do začiatku odnožovania trávovitých burín
- dávka od 0,35 – 0,5 (1) l.ha⁻¹ – výmrv, 0,75 – 1 (1) l.ha⁻¹ – trváce jednoklíčnolistové buriny, 1 (1) l.ha⁻¹ – odolné jednoročné jednoklíčnolistové buriny
- (TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného oleja (Istroekol)
- dávka vody 200 – 400 l.ha⁻¹

Vivendi 600

Clopyralid 600 g.l⁻¹

- selektívny herbicíd určený na postemergentné ničenie odolných dvojkličnolistových burín, **hlavne rumanov, rumančekov a pichliača roľného**
- účinná látka je prijímaná listami a byľami rastlín, následne prenášaná do koreňov
- buriny krátko po postreku zastavujú rast, blednú, skrúcajú sa v priebehu 10-21 dní hynú
- ostatné citlivé buriny - púpava lekárska, chryzantémovka siatinová, starček obyčajný a ďalšie buriny z čeľade astrovité, mlieč zelinný
- aplikujeme od druhého listu repky (BBCH 12) po štádium kvetných pukov (BBCH 50)
- aplikácia dávka 0,33 l.ha⁻¹
- dávka vody 200 l.ha⁻¹

Probus

Prothioconazole 250 g.l⁻¹

- systémový fungicíd s preventívnym a kuratívnym pôsobením určený na ochranu pšenice ozimnej a repky ozimnej proti hubovým chorobám
- prothioconazole patrí do chemickej skupiny triazolthiolinov a na škodlivé organizmy pôsobí inhibíciou tvorby ergosterolu
- podobne ako strobiluríny pôsobí stimulačne a tým podporuje zvýšenie úrody
- v repke ozimnej je registrovaný proti bielej hnilobe
- dávka 0,7 l.ha⁻¹
- aplikácia od začiatku vývoja plodu do začiatku dozrievania (BBCH 70–80).
- maximálny počet aplikácií: 2x za vegetáciu
- dávka vody: 200–500 l.ha⁻¹
- interval medzi aplikáciami 14–28 dní

Probus Plus

Prothioconazole 250 g.l⁻¹

- systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu pre repku v dávke 0,7 l.ha⁻¹
- prothioconazol – dobrá účinnosť na široké spektrum hubových patogénov a dlhá doba trvania účinku
- repka jarnej aj ozimnej – biela hniloba (BBCH 30–59)
- maximálny počet aplikácií 2x za vegetáciu v intervale 10 dní



HERBICÍDY A FUNGICÍDY

Chamane

Azoxystrobin 250 g.l⁻¹

- účinkuje proti väčšine významných chorôb repky (čerň repková, biela hniloba)
- systémovo a translaminárne pôsobiaci fungicíd
- aplikuje sa pred alebo na začiatku infekcie
- vyznačuje sa dlhodobým účinkom, po dobu 3–8 týždňov
- vynikajúci partner do TM zmesí s ďalšími fungicídmi
- aplikačná dávka 1 l.ha⁻¹
- dávka vody 100 – 300 l.ha⁻¹, podľa hustoty porastu
- počet aplikácií max. 2x za sezónu
- využite výhodnejšiu cenu – balíček CHAMANE + TEBUFLEX

Tebuflex 500

Tebuconazole 500 g.l⁻¹

- registrácia pre repku ozimnú (aj obilniny) proti hubovým chorobám
- jesenná aplikácia – fómová hniloba, morforegulácia
- jarná aplikácia – biela hniloba, černe, morforegulácia
- výrazne prispieva ku zvýšeniu úrody
- dávka 0,5 l.ha⁻¹
- odporúčame kombinovať s hnojivom **THIOMAX Mn**, alebo **WUXAL OILSEED**

INSEKTICÍDY A MOLUSKOCÍDY

Ironmax Pro

Fosforečnan železitý 24,2 g.kg⁻¹



- prípravok vo forme návnady pripravenej na použitie, určený na reguláciu slizniakov
- preventívna aplikácia v dávke 7 kg.ha⁻¹
- aplikáciu opakujeme podľa potreby maximálne 4x za rok
- mŕtve slizniaky nie je vidieť, stiahnu sa pod povrch pôdy, kde uhynú
- vynikajúca formulácia odolná voči dažďu

Scatto

Deltamethrin 25 g.l⁻¹

- pyretroid s dotykovým a požerovým účinkom proti cicavému a žravému hmyzu
- deltamethrin je svetlo stabilný syntetický pyretroid, pôsobí na nervový systém hmyzu
- použitie v repke pri výskyte škodlivého organizmu
- skočka repková - BBCH 1013 - kľúčne až 3 listy
- blyskáčik repkový - BBCH 50-65 - kvetné pupene prítomné až plné kvitnutie
- krytonos šesťušový - BBCH 50-75 - kvetné pupene prítomné až 50 % šesťuší dosiahlo konečnú veľkosť
- aplikačná dávka 0,2 l.ha⁻¹
- dávka vody 300 l.ha⁻¹
- počet aplikácií max. 1x za sezónu

Belem 0,8 mg

Cypermethin 8 g.kg⁻¹

- širokospektrálny insekticíd vo forme mikrogranúl pre použitie pri výseve
- účinná látka je syntetický pyrethroid spôsobujúci paralýzu hmyzu, s dotykovým aj požerovým účinkom
- po zahrnutí brázdy vytvára ochrannú bariéru okolo semena či sadenice
- účinná látka nie je rozpustná vo vode, takže granule prípravku Belem® 0,8 Mg pôsobia primárne pri kontakte, bez difúzie alebo mobility v pôde (vďaka prenášaču uhličitane vápenatého s vysokou hustotou)
- účinkuje na veľkú škálu hmyzích škodcov v pôde, hlavne na drôtovcu
- aktivita prípravku v pôde závisí od množstva svetla a prípravok v pôde perzistuje od 1,5 do 2 mesiacov
- aplikačná dávka v cukrovej repa 12 kg/ha proti drôtovcu

Delta Expert

Deltamethrin 100 g.l⁻¹



- insekticídny prípravok na báze svetlostabilného pyretroidu, s dotykovým a požerovým účinkom
- vošky – vektory viróz v dávke 0,0625 l.ha⁻¹ ako jesenná aplikácia BBCH10–19. Účinkuje aj proti skočkám.
- krytonos repkový, v dávke 0,0625 l.ha⁻¹, aplikujte vo fáze BBCH 30–35
- blyskáčik repkový, dávka 0,075 l.ha⁻¹, aplikujte vo fáze BBCH 50, opakujte v BBCH 55–59
- krytonos šesťušový a bylomor kelový, dávka 0,075 l.ha⁻¹, aplikujte vo fáze BBCH 65–69

Tamer

Zloženie: acetamiprid 200 g.l⁻¹

- acetamiprid účinná látka s translaminárnym pohybom v rastline pôsobí ako požerový a kontaktný insekticíd.
- pôsobí neurotoxicky – paralyzuje cieľového škodcu
- krytonos repkový, k. štvorzubý, k. šesťušový – dávka 0,15–0,3 l.ha⁻¹
- blyskáčik repkový, bylomor kelový – dávka 0,18 – 0,3 l.ha⁻¹
- repku ozimnú aj repku jarnú ošetrovať od 1. odnože do fázy 10% šesťuší dosiahlo konečnú veľkosť – bbch 31–71
- maximálny počet ošetrení 2x počas vegetácie.

Elastiq Gold

Karbox. styrén butadién kopolymér 455,5 g.l⁻¹

- po aplikácii prípravku sa na povrchu vytvára polymérna polopriepustná membrána
- obmedzuje praskanie šesúľ a vypadávanie semien, znižuje predzberové a zberové straty
- k polymerizácii nie je potrebné denné svetlo
- registrácia na zníženie predzberových a zberových strát 0,8-1,0 l.ha⁻¹
- aplikácia 3-4 týždne pred očakávaným zberom (šesule ohnúť do tvaru „V“ bez prasknutia)
- množstvo vody pri pozemnej aplikácii 250-500 l.ha⁻¹, pri leteckej 70-90 l.ha⁻¹
- registrácia na desikáciu a zníženie predzberových a zberových strát v dávke 0,8 l.ha⁻¹ ELASTIQ GOLD + 3,0 l.ha⁻¹ KAPUT GREEN



Gondor

Lecitin 495 g.l⁻¹

- adjuvant pre použitie v zmesi s herbicídmi a regulátormi rastu
- registrácia vo všetkých plodinách, na ornej, lesnej a nepoľn. pôde vrátane železníc
- zvyšuje priľnavosť a rozprestretie postrekovej zmesi
- zvyšuje penetráciu a translokáciu aplikovaných pesticídov
- znižuje nežiaduci úlet pri aplikácii postrekovej zmesi
- dávka 0,25-0,4 l.ha⁻¹, (max konc. 0,25 %)
- dávka vody: 100-200 l.ha⁻¹ pri dávke 0,25 l.ha⁻¹ nad 200 l.ha⁻¹ pri dávke 0,4 l.ha⁻¹
- **pri príprave postrekovej zmesi dávajte adjuvant prvý**

Silwet Gold

Polyalkyleneoxid heptamethyl trisiloxane (80%)

Allyloxypolyethyleneglycol (20%)

- neiónové organosilikónové zmáčadlo s vysokoúčinnou schopnosťou znížiť povrchové napätie postrekovej kvapaliny
- zabezpečuje rovnomerné rozptýlenie postreku
- rýchly prienik do rastliny
- mimoriadne bezpečný pre rastliny
- najbežnejšia dávka je 0,1 l.ha⁻¹, (povolená od 0,025 do 0,15 l.ha⁻¹)



Azosped Amino

Zloženie: N 300 g.l⁻¹, vo vode rozpustný oxid horečnatý 33 g.l⁻¹; vo vode rozpustný oxid sirový 68 g.l⁻¹, aminokyseliny 5 % hmotnostných

- dávka 3–5 l.ha⁻¹ + dávka vody minimálne 100 l.ha⁻¹
- aplikovať vo fáze 4–8 listov potom na začiatku predlžovania stonky (BBCH 30) a na konci pučenia kvetenstva (BBCH 59)
- obsahuje dve formy dusíka s rýchlejším a pozvoľným uvoľňovaním
- možná aplikácia s fungicídmi
- balenie 10 l kanistre

Fixa Mn

Zloženie: Mn 120 g.l⁻¹, SO₃ 170 g.l⁻¹

- ES hnojivo
- dávka 2 l.ha⁻¹, dávka vody 200 l
- neaplikovať pri teplote vyššej ako 28 °C
- 1 aplikácia vo fáze predlžovacieho rastu

Wuxal Microplant

Zloženie: N celkový 78 g.l⁻¹, K₂O 157 g.l⁻¹, MgO 47 g.l⁻¹, B 4,7 g.l⁻¹, Cu 7,9 g.l⁻¹, Fe 15,7 g.l⁻¹, Mn 23,6 g.l⁻¹, Mo 0,15 g.l⁻¹, Zn 15,7 g.l⁻¹, SO₃ 204 g.l⁻¹, katióny Fe, Cu, Mn, Zn sú v cheláte s EDTA

- vysoké zastúpenie mikroprvkov
- zvyšuje odolnosť voči stresu
- vhodný do všetkých plodín
- rýchle doplnenie akéhokoľvek deficitu vo výžive porastu
- dávka 1-2 l.ha⁻¹, aplikáciu môžeme opakovať 2-3 krát

**VITAMÍNOVÁ
BOMBA!**

Boronia

Zloženie: B 150,7 g.l⁻¹

- rýchle doplnenie nedostatku bóru
- zlepšenie zakorenenia, zimuvzdornosti, opelenia
- zvýšenie násady kvetov, zrovnomenie dozrievania
- dávka 3 l.ha⁻¹ spravidla 2x počas vegetačného obdobia v kombinácii s bežnými pesticídmi
- 1. aplikácia na zač. vývoja (fáza 3-6 listov, t.j. na jeseň)
- 2. aplikácia na dobre vyvinuté listy (čo najskôr na jar) (TM s insekticídmi proti krytonosom)



Wuxal Boron Plus

Zloženie: N 70 g.l⁻¹, P₂O₅ 183 g.l⁻¹, Bór 108 g.l⁻¹, Mn 0,7 g.l⁻¹, Zn 0,7 g.l⁻¹, Mo 0,014 g.l⁻¹, Cu 0,7 g.l⁻¹, Fe 1,4 g.l⁻¹

- vysokokonzentrované hnojivo s obsahom fosforu, bóru a iných mikroživín
- pre vyššiu úrodu oleja
- podpora dobrého vývinu šesúľ a semien
- špeciálna formulácia **XTRA UPTAKE®** zvyšuje príjem a účinnosť obsiahnutých živín
- aplikujeme 2x za sezónu (predlžovací rast a štádium butonizácie až do začiatku kvitnutia)
- dávka 1-2 l.ha⁻¹

Wuxal Oilseed

Zloženie: B 84 g.l⁻¹, Mn 70 g.l⁻¹, Mo 3,5 g.l⁻¹, SO₃ 105 g.l⁻¹

- špeciálne listové hnojivo s obsahom B, Mn, Mo vo forme suspenzie
- optimálny pomer mikroživín pre olejiny (repka olejná, slnečnica)
- vysoká účinnosť a ľahká manipulácia
- mikroživiny okamžite prijateľné cez listy
- zintenzívňuje vývoj repky na jeseň, zlepšuje odolnosť voči mrazu
- zlepšuje tvorbu šesúľ a znižuje straty šesúľ
- zvyšuje úrodu a zvyšuje obsah oleja v semenách
- dávka 2 l.ha⁻¹,
 - repka - 3x za sezónu (4. až 6. list, predlžovací rast, pred kvetom)
 - slnečnica - 2x za sezónu (štádium tvorby listov, začiatok predlžovacieho rastu)

Thiomax Mn

Zloženie: SO₃ 1000 g.l⁻¹ a Mn 41 g.l⁻¹

- hnojivo ES, moderná tekutá formulácia
- doplnenie síry zabezpečuje vysokú úrodu a zlepšuje kvalitatívne parametre
- možnosť miešania spolu s prípravkami na ochranu rastlín a listovými hnojivami (DAM)
- rýchly účinok
- 1 až 3 aplikácie (1. na jar po znovuoobnovení vegetácie, ďalšie aplikácie v 10-15 denných intervaloch)
- nízka dávka, 2-5 l.ha⁻¹

Eutrofit

Zloženie: N v organickej forme 3,7 %, Fe min. 600 ppm

- aplikujeme na vzídený porast v jesennom období a na jar hneď ako je to možné
- prípravok má výrazné repelentné účinky na poľnú zver (ochrana vzídených porastov pred požerami)
- opakované aplikácie v priebehu 14-21 dní v závislosti na priebehu počasia
- celoplošné ošetrovanie porastov nie je nutné, ošetrojeme len okraje porastov (1 až 2 zábery postrekovačom)



Fertiamino

Zloženie: N 108 g.l⁻¹, P₂O₅ 36 g.l⁻¹, K₂O 84 g.l⁻¹, MgO 12 g.l⁻¹, B 0,48 g.l⁻¹, Cu 0,12 g.l⁻¹, Fe 0,24 g.l⁻¹, Mn 0,48 g.l⁻¹, Mo 0,048 g.l⁻¹, Zn 0,36 g.l⁻¹, aminokyseliny 24 g.l⁻¹

- vzájomne uznané organominerálne hnojivo
- dávka 5 l/ha v maximálnej koncentrácii 5 %
- maximálne 1 aplikácia v období od steblovania bbch 30 do zdurovania pošvy vlajkového listu bbch 45
- príjem aminokyselín stimuluje zvýšenie fotosyntézy
- aminokyseliny a stopové živiny zlepšujú asimiláciu pôdou prijatých živín
- používajte na aplikáciu na list.

Boronia Mo6

listové hnojivo v mikroelementmi

Zloženie: 60 g.l⁻¹ dusík (N) ako močovinový; 120 g.l⁻¹ bór (B) ako ethanolamín; 6 g.l⁻¹ Molybdén (Mo) ako amónna soľ vo vode rozpustný

- z mikroelementov má cukrovka vysoké nároky na bór a mangán. Nedostatok bóru aj mangánu napríklad aj pri alkalickéj pôdnej reakcii účinne doplní aplikácia listového hnojiva
- vykonajte 2 aplikácie na začiatku rastu a na dobre zapojený porast v dávke 1–3 l.ha⁻¹ a dávke vody 200 l.ha⁻¹



Táto publikácia má informatívny charakter. Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.



Produkt je povolený pre použitie v ekologickom poľnohospodárstve podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/1165, ktorým sa povoľujú určité produkty a látky na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a stanovujú ich zoznamy.

Poradenstvo

Ing. Miroslav Bohunický
mobil: 00421 918 491 743
e-mail: m.bohunicky@agroalliance.sk

Ing. Ján Gajdoš
mobil: 0915 781 289
e-mail: j.gajdos@agroalliance.sk

Andrea HAJDÚKOVÁ
mobil: 0905 526 442
e-mail: a.hajdukova@agroalliance.sk

Ing. Boris Vladovič
mobil: 0917 881 042
e-mail: b.vladovic@agroalliance.sk