

# WUXAL® SUS KOMBI MG

Špeciálne vysoko koncentrované suspenzné hnojivo s vysokým obsahom horčička pre použitie hlavne v chmeli, poľných plodinách, ovocinárstve, vo viniči, v okrasných rastlinách a zelenine.

**Zloženie:** celkový N 20,0 % (300 g.t<sup>-1</sup>); (dusičnanový 4,3 %, amoniakálny 0,5 %, močoviny 15,2 %) K<sub>2</sub>O 15,0 % (225 g.t<sup>-1</sup>) MgO 4,0 % (60 g.t<sup>-1</sup>) B 0,02 % (0,3 g.t<sup>-1</sup>), SO<sub>3</sub> 1,75 % (26,2 g.t<sup>-1</sup>), Cu 0,05 % (0,75 g.t<sup>-1</sup>), Fe 0,1 % (1,5 g.t<sup>-1</sup>), Mn 0,05 % (0,75 g.t<sup>-1</sup>), Mo 0,001 % (0,015 g.t<sup>-1</sup>), Zn 0,05 % (0,75 g.t<sup>-1</sup>) katióny Fe, Cu, Mn, Zn sú v cheláte s EDTA

## ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

WUXAL® SUS KOMBI MG je vysoko koncentrované bezfosforové hnojivo vhodné pre aplikáciu na list. Prípravok je možné použiť vo všetkých poľných plodinách, v ovocinárstve, zeleninárstve i okrasnom záhradníctve, zvlášť vtedy, keď je v pôde k dispozícii dostatočná zásoba fosforu a rastliny majú zvýšené nároky na horčík. Môže sa použiť tak preventívne, ako i kuratívne, po prejavení sa príznakov nedostatku horčička.

## ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

**Obilniny** - je vhodné použiť WUXAL® SUS KOMBI MG 2-4x, a to v období od odnožovania až do klasenia, dávka 3-5 l.ha<sup>-1</sup>.

**Kukurica** - prípravok sa aplikuje 3x v období medzi fázou 2-11 listov, dávka 3-5 l.ha<sup>-1</sup>.

**Zemiaky** - aplikuje sa 3x, prvýkrát začiatkom tvorby púčikov ( fáza 50), opakuje sa začiatkom kvitnutia a potom o 14 dní, dávka 5 l.ha<sup>-1</sup>.

**Cukrová a krmná repa** - aplikuje sa 3-5x od fázy 4 listov do uzatvorenia riadkov, dávka 5 l.ha<sup>-1</sup>.

**Zelenina** - aplikuje sa v koncentrácii 0,05-0,1 % (50-100 ml na 100 l vody) podľa potreby v kombinácii s bežnými pesticídmi.

**Okrasné rastliny** - aplikuje sa v koncentrácii 0,05-0,1 % (50-100 ml na 100 l vody) v kombinácii s bežne používanými pesticídmi. V mladších rastlinách a v kultúrach s mäkkými, jemnými listami je vhodné použiť spodnú hranicu uvedenej koncentrácie.

**Chmeľ** - prípravok v koncentrácii 0,15 % sa kombinuje s ošetrením proti peronospóre. Pri použití úsporných postrekov nesmie koncentrácia prevýšiť 0,3%. Pri zvýšenej potrebe dávkovania zinku možno WUXAL® SUS KOMBI MG použiť v zmesi so síranom zinočnatým (0,2%). Ošetrje sa 2-4x.

**Ovocie** - aplikácia 2-3x v dávke 3-5 l.ha<sup>-1</sup> v kombinácii s bežne používanými pesticídmi, prvýkrát v rastovej fáze tesne pred vytvorením ružového púčika (E2). V jabloniach sa v dobe po druhej aplikácii po odkvitnutí odporúča prejsť na WUXAL® SUS KALCIUM.

**Vinič** - aplikácia v dávke 3-5 l.ha<sup>-1</sup> v kombinácii s bežne používanými pesticídmi proti peronospóre, celkom 5x.

## MIEŠATEĽNOSŤ, PRÍPRAVA POSTREKU

Hnojivo treba v obale najprv dôkladne rozmiešať a potom cez sitko naliať do nádrže postrekovača a spláchnuť vodou. Počas rozpúšťania musí byť miešacie zariadenie v činnosti. Taktiež je možné rozmiešať hnojivo s vodou priamo v obale alebo v pomocnej nádrži a vliať do nádrže. Voda sa potom za stáleho miešania doplní na stanovený objem. Pri príprave zmesi s pesticídmi sa do nádrži vždy vleje ako prvý Wuxal a až potom sa podľa predpísaného postupu dávkuje príslušný pesticíd.

Hnojivo je fyzikálne a chemicky miešateľné s fungicídmi aj insekticídmi, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Možnosť miešania musí byť konzultované s výrobcou pesticídu. Neodporúčame ho používať v zmesi so silno alkalickými postrekmi typu Bordeauxskej alebo sírovápenatej zmesi a s poly sulfidmi. Pred prvým prevádzkových ošetrovaním okrasných rastlín zmesou Wuxalu s pesticídmi odporúčame overiť citlivosť kultúry k tejto zmesi v daných miestnych podmienkach. WUXAL® SUS KOMBI M neodporúčame miešať s WUXAL® SUPER.

Pri riedení je potrebné zachovať nasledujúci postup:

1. Hnojivo je potrebné v obale dokonalým premiešaním homogenizovať.
2. Do nádrže dajte cca 3/4 množstva vody.
3. Zapnite miešanie.
4. Pridajte odmerané množstvo prípravku. Starostlivo vypláchnite obal a pridajte do nádrže.
5. Potom príp. pridajte ďalšie hnojivá typu Wuxal®.
6. Potom príp. pridajte pesticídne prípravky.
7. Nádrž doplňte vodou na stanovený objem.

Prípravenú zmes je potrebné čo najrýchlejšie vystriekať, nemôže sa pripravovať do zásoby.

**Balenie:** 10 l, 100 l