

ODPORUČANÉ KOMBINÁCIE PRE SYSTÉM OŠETRENIA CUKROVEJ REPY

APLIKÁCIA T-1

ZÁKLADNA KOMBINÁCIA		DOPLNENIE KOMBINÁCIE	
PRÍPRAVOK	DÁVKA (l, kg.ha ⁻¹)	PRÍPRAVOK	DÁVKA (l, kg.ha ⁻¹)
FENIFAN [®]	2,0 – 3,0	PERMUSON PRO [®] VENZAR [®] 500 SC	0,3 0,05 - 0,1
STEMAT [®] SUPER	0,2 - 0,3		
METAFOL [®] 700 SC	1,0 - 1,5		
GONDOR [®]	0,25		
FENIFAN [®]	1,0		
TANDEM STEFES [®] FL	1,0		
METAFOL [®] 700 SC	1,0		
GONDOR [®]	0,25		

APLIKÁCIA T-2

ZÁKLADNA KOMBINÁCIA		DOPLNENIE KOMBINÁCIE	
PRÍPRAVOK	DÁVKA (l, kg.ha ⁻¹)	PRÍPRAVOK	DÁVKA (l, kg.ha ⁻¹)
FENIFAN [®]	2,0 – 3,0	PERMUSON PRO [®] VENZAR [®] 500 SC VIVENDI [®] 600 EVOLUTION [®]	0,6 0,4 – 0,6 0,17 0,5 – 1,0
STEMAT [®] SUPER	0,3 - 0,4		
METAFOL [®] 700 SC	1,0 - 1,5		
GONDOR [®]	0,25		
TANDEM STEFES [®] FL	1,5		
METAFOL [®] 700 SC	1,0 - 1,5		
GONDOR [®]	0,25		

APLIKÁCIA T-3

ZÁKLADNA KOMBINÁCIA		DOPLNENIE KOMBINÁCIE	
PRÍPRAVOK	DÁVKA (l, kg.ha ⁻¹)	PRÍPRAVOK	DÁVKA (l, kg.ha ⁻¹)
FENIFAN [®]	1,0 – 2,0	EVOLUTION [®] PERMUSON PRO [®] VIVENDI [®] 600 BORONIA [®] BORONIA [®] MO6 WUXAL [®] BORON PLUS	0,5 – 1,0 0,6 0,33 1,0 – 3,0 1,0 – 3,0 1,0 – 2,0
STEMAT [®] SUPER	0,4 - 0,5		
VENZAR [®] 500 SC	0,4 – 0,6		
GONDOR [®]	0,25		
TANDEM [®] STEFES FL	1,5		
VENZAR [®] 500 SC	0,4 – 0,6		
GONDOR [®]	0,25		

FUNGICÍDNE OŠETRENIE

PRÍPRAVOK	DÁVKA (l, kg.ha ⁻¹)	DOPLNENIE	DÁVKA (l, kg.ha ⁻¹)
MERCURY [®]	1,0	ALICUPRIN [®]	1,6 – 2,6
EMINENT [®] 125 ME	0,8	CIGOFOL [®]	1,0 – 2,0

INSEKTICÍDNE OŠETRENIE

PRÍPRAVOK	DÁVKA (l, kg.ha ⁻¹)	DOPLNENIE	DÁVKA (l, kg.ha ⁻¹)
BELEM [®] 0,8 MG	12	BORONIA [®] MO6	1,0 – 3,0
DELTA [®] EXPERT	0,075	FERTIAMINO [®]	5

ODPORÚČANIA PRE OŠETRENIA CUKROVEJ REPY A KU KOMBINÁCIÁM PRÍPRAVKOV

1. Kombinácia graminicidu EVOLUTION® s prípravkami na báze metamitronu (METAFOL® 700 SC) môže v niektorých prípadoch znížiť jeho účinnosť resp. selektivitu.
2. V prípade výskytu pichliča, rumanov, pohánkovca, horčiakov používame výrobok VIVENDI® 600 na báze clopyralidu podľa špecifických odporúčaní pre použitie tejto účinnej látky v cukrovej repe.
3. V prípade potreby zvýšenia účinnosti jednotlivých prípravkov v kombináciách v T-1 až T-3
 - a) Posilnenie účinku na horčiak, lipkavec, bažanku a citl. Jedn. Tráva a pôdneho účinku s prípravkom STEMAT® SUPER v dávke 0,2-0,5 l.ha⁻¹.
 - b) Posilnenie pôdneho účinku prípravkom PERMUSON® Pro v dávke 0,3 (T1)-0,6 (T2, T3) l.ha⁻¹, METAFOL® 700 SC v dávke 1,0-2,0 l.ha⁻¹.
 - c) Letné zaburinenie prípravkom VENZAR® 500 SC v dávke 0,2-0,5 l.ha⁻¹.
 - d) Ničenie pichliča roľného podľa príslušných odporúčaní prípravkom VIVENDI® 600.
4. V ošetreniach je možné použiť:
 - a) adjuvant GONDOR® v dávke 0,2-0,25 l.ha⁻¹.

APLIKÁCIA PRÍPRAVKOV V CUKROVEJ REPE

Buriny v cukrovej repe vzhádzajú vo vlnách. Pri ošetrení cukrovej repy je potrebné klásť dôraz na včasnosť a kvalitu aplikácií.

Prvá aplikácia sa vykonáva pri objavení sa prvých burín, teda v štádiu kľíčnych lístkov.

Druhá postemergentná aplikácia herbicidov má za úlohu zničiť buriny vzídené po prvej aplikácii a „doraziť“ poškodené buriny, ktoré prvá aplikácia celkom nezničila. Vykonáva sa 5-9 dní po prvej aplikácii, keď vznikne nové zaburinenie a prvé lístky druhej vlny burín majú kľíčne lístky. Ak bola prvá aplikácia 100 % účinná, s druhou počkáme na vzídenie novej vlny burín. Pokiaľ prvá aplikácia nespĺnila svoj účel (zmytie dažďom, prerastené buriny, chybná aplikácia, nevhodná kombinácia trysiek a tlaku a pod.), je potrebné druhú aplikáciu zopakovať za 3-5 dní a to úmerne zvýšenou dávkou. Pri zvýšení dávky vychádzame z poškodenia či nepoškodenia burín pri prvej aplikácii.

Tretia postemergentná aplikácia sa vykonáva na vzídené buriny zväčša za 10-14 dní po úspešnej druhej aplikácii. K tejto tretej aplikácii je účelné pridávať herbicid proti letnému zaburineniu. Proti letnému zaburineniu musíme intenzívne bojovať od začiatku vegetácie, hlavne dôsledným použitím pôdnych herbicidov v druhej a tretej postemergentnej aplikácii.