

ALGEDI®

Účinná látka: Tritosulfuron 250 g.kg⁻¹; Dicamba 500 g.kg⁻¹

HERBICÍDY

Postrekový prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) určený na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v ozimných a jarných obilninách a kukurici.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ALGEDI® je kombinovaný systémový herbicíd prijímaný predovšetkým listami, čiastočne aj cez korene burín.

Účinná látka tritosulfuron patrí do skupiny sulfonylmočovín. Herbicídna účinnosť spočíva predovšetkým v brzdení syntézy enzýmu acetolaktát syntetázy, ktorá je dôležitá pri tvorbe aminokyselín. Translokácia účinnej látky v rastlinách sa uskutočňuje bazipetálne a akropetálne. Účinná látka dicamba zo skupiny aminobenzoových kyselín ovplyvňuje hladinu auxínov v rastline a tým narušuje delenie buniek.

V pôde sa účinné látky ALGEDI® odbúravajú veľmi rýchlo. Po jeho použití sa nemení pôdna mikrofóra, ani jej biologická aktivita.

Účinok sa prejaví po 3-5 dňoch zastavením rastu a buriny už v tomto štádiu prestávajú konkurovať plodine. Buriny postupne žltnú, v priebehu 2-3 týždňov úplne hynú. Účinok urýchľuje teplé a vlhké počasie.

SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

Citlivé buriny: rumančeky, rumany, lipkavec obyčajný, pichliač roľný, mak vľčí, horčica roľná, kapsička pastierska, mrlíky, hluchavky, veroniky (len so zmáčadlom).

Odolné buriny: stavikrv vtáčí, fialka roľná, prhľavy a všetky trávovité buriny.

NÁVOD NA POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA l.ha ⁻¹	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
pšenica ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) Dash
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 kg	AT	
		0,15 kg + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) Dash
jačmeň ozimný, ovos siaty, raž ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg	AT	
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,2 kg	AT	(TM) Dash
		0,2 kg+ (0,5 l)	AT	

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 300-400 l.ha⁻¹.

Maximálny počet aplikácií 1x za vegetáciu.

Postrekujte v štádiu 2-6 listov burín (BBCH 12-16). Pri aplikácii na jar je najvýhodnejšie, keď sú ozimné obilniny v čase aplikácie v rastovej fáze od troch listov až do konca odnožovania (BBCH 13-29), jarné obilniny v rastovej fáze od 3 listov až do plného odnožovania (BBCH 13-25) a kukurica v rastovej fáze 3 až 5 listov (BBCH 13-15).

V našej ponuke je adjuvant Silwet Gold, ktoré zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť postrekovej kvapaliny a umožňuje jej lepšiu distribúciu aj na tie časti rastlín, ktoré nie sú pri aplikácii priamo zasiahnuté.

Upozornenie

Po aplikácii prípravku ALGEDI® nie sú známe negatívne účinky na následné plodiny. Ak je potrebné plodinu ošetrovať prípravkom ALGEDI® zaorať, je možné ako náhradnú plodinu zaradiť jarné obilniny a kukuricu. Ako náhradné plodiny neodporúčame vysievať repku jarnú, repu cukrovú, hrach a sóju.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny.

Balenie: 1 l HDPE fľaša plnená do 0,8 kg
2 l HDPE kanister plnený do 1,0 kg