

ETHREL®

Účinná látka: ethephon 480 g.l⁻¹

Postrekový prípravok vo forme tekutého koncentrátu miešateľného s vodou určený na urýchlenie dozrievania, zlepšenie kvality, redukciu nadmernej násady plodov, zvýšenie odolnosti proti poľiehaniu a na uľahčenie mechanizovaného zberu v poľnohospodárstve.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ETHREL® je regulátor rastu, ktorý ľahko preniká do pletív, kde sa jeho účinná látka ethephon rozkladá a uvoľňuje sa etylén. Etylén, v závislosti od dávky a termínu aplikácie prípravku, vyvoláva v rastline rôzne fyziologické účinky: brzdí rast, urýchľuje proces dozrievania, urýchľuje opad plodov, atď.

NÁVOD NA POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL'	DÁVKA l.ha ⁻¹	OCHRANNÁ DOBA	POZNÁMKA
rajčiak (skleníkový)	urýchlenie dozrievania	2,5-3l	10-14	na konzervovanie
tabak	urýchlenie dozrievania	3-6l	AT	
čerešňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05-0,07 %	7-14	na konzervovanie
višňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05-0,07 %	7-14	na konzervovanie
okrasné rastliny	zlepšenie akosti	0,05-0,3 % (0,2-0,3 l.m ⁻²)	AT	zálievka

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Tabak - postrekujte koncom augusta, resp. začiatkom septembra na odkvitnuté tabakové kultúry. Dávka prípravku sa volí podľa veku kultúry. Zelené typy tabaku 4-6 l.ha⁻¹, žltozelené typy 3-4 l.ha⁻¹. Dávka vody 400-600 litrov na hektár. Postrekujte tak, aby boli zasiahnuté horné dve tretiny rastliny.

Rajčiak - urýchlenie dozrievania. Prípravok napomáha k skoršiemu a rovnomernejšiemu dozrievaniu rajčín. Postrekujte v dobe, keď 10 až 15 % plodov je v štádiu plnej zrelosti, prípadne po prvom zbere. Je možné vykonať tiež delenú aplikáciu, kedy prvý postrek dávkou 1,5 l.ha⁻¹ prípravku sa vykoná v dobe zrelosti 5 až 10 % plodov, druhý postrek dávkou 1 l.ha⁻¹ po týždni, touto dvojitou aplikáciou sa predĺži doba pôsobenia ethephonu a zníži sa spotreba prípravku. Podľa veku porastu volíme dávku vody 600 až 800 litrov na hektár. Aplikácia pri teplote nižšej než 16 °C môže spôsobiť odfarbenie listov, ktoré nemá vplyv na výšku úrody. Plody z ošetrených porastov môžu byť použité len na konzervárenské spracovanie!

Čerešňa, višňa - uľahčenie mechanizovaného zberu. Čerešne na konzervovanie: aplikujte 7 až 14 dní pred predpokladaným zberom.

Višne na konzervovanie - aplikujte 7 až 14 dní pred predpokladaným zberom.

Postrekujte za bezvetria alebo mierneho vánku tak, aby jemnou hmlou postreku boli dokonale (do odkvapkávania) a rovnomerne ovlhčené plody i listy. Množstvo postrekovej kvapaliny 1000 l na ha.

Okrasné rastliny - zlepšenie akosti. Prípravok možno použiť na reguláciu rastu črepníkových rastlín, letničiek pestovaných na výsadbu do záhonov alebo na rýchlenu v kvetináčoch a okrasných drevín určených na rýchlenu a pestovanie v nádobách. Aplikujte pomocou zálievky 0,05–0,3 % roztok v množstve 0,2–0,3 l roztoku na 1 m².

Upozornenie

ETHREL® aplikujte len na suché rastliny, nepoškodené škodcami, chorobami a nedostatkom živín. Dážď v dobe do 4-5 hodín po postreku znižuje účinnosť prípravku. Denná teplota v dobe aplikácie i po nej by mala byť vyššia než 16 °C. Neaplikujte v období dlhotrvajúceho sucha. Plody ošetrené prípravkom ETHREL® môžu byť použité len na konzervárenské spracovanie, nesmú byť použité na priamy konzum. Ošetrte za bezvetria alebo mierneho vánku, zabráňte zasiahnutiu susedných kultúr.

MIEŠATELNOSŤ

ETHREL® nemiešajte s prípravkami obsahujúcimi dithiokarbamáty, maneb, zineb, siru a meď. Nemiešajte s herbicidmi a tekutými hnojivami. Prípravok môžete kombinovať s niektorými fungicidmi, ale pred použitím urobte skúšku na kompatibilitu.

Balenie: 1 l HDPE fľaša, 5 l HDPE kanister