



Aliberon[®]

Delta Expert[®]

Chamane[®]

Nexa[®] 500 SC

Protebo[®]

Shepherd[®] Solo

Toluron[®]

Tebuflex[®]

Obilniny
ochrana a listová výživa

Prípravky firmy Agro Aliance SK

**Šetríme Vaše
peniaze!**

S VAMI, PRE VÁS

Agritox 50 SL

MCPA vo forme Na-K-DMA soli 500 g.l⁻¹

- určený proti dvojkličnolistovým a trvácim burinám v obilninách, semenných porastoch tráv, na lúkach a pasienkoch a v däteline lúčnej
- prípravok má rýchly účinok
- citlivé buriny - redkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, mrlík biely, pichliač roľný, štiavy, iskerníky, peniažtek roľný
- stredne citlivé buriny - nezábudka roľná, konopnica napuchnutá, láskavec ohnutý, mak vlčí, veroniky, chryzantémovka siatinová
- dávka 1,5 l.ha⁻¹, v kombináciách s inými herbicídmi (napr. VIVENDI 200)
- možná kombinácia s regulátormi rastu (CELSTAR 750 SL), DAM 390, močovinou a listovými hnojivami s obsahom stopových prvkov (PROTEBO)

Pendiflex 400

Pendhimetalin 400 g.l⁻¹

- dávka 3,3-4,0 l.ha⁻¹
- pre i postemergentná aplikácia (BBCH10 – 11) v kombinácii s prípravkom Delfin (0,25 l.ha⁻¹)
- veľmi dobrá účinnosť na široké spektrum jedno i dvojkličnolistových burín
- dávka vody 400-600 l.ha⁻¹

Kaput Green

Glyphosate 360 g.l⁻¹

- na ničenie jednoročných a trvácich burín
- neselektívny herbicíd so systémovým účinkom
- ničenie trvácich burín pred zberom a urýchlenie dozrievania
- výrazné zníženie zberových strát
- ekonomicky zaujímavé odburinenie plôch pre následné plodiny (aplikácia na strniská)
- dávka 3 l.ha⁻¹
- odporúčané množstvo vody 150-200 l.ha⁻¹
- zmáčadlo GONDOR výrazne urýchľuje účinnosť

Procarb

Prosulfocarb 800 g.l⁻¹

- selektívny herbicíd vo forme emulzného koncentrátu
- preemergentné (BBCH 00–09) a skoré postemergentné (BBCH 11–25) použitie v ozimnej pšenici, ozimnom jačmeni a ozimnom tritikale
- dávky 5 l/ha proti dvojkličnolistovým burinám a trávam
- prípravok má najvyššiu účinnosť pri aplikácii na vlhkú pôdu a buriny v skorých vývojových štádiách



Duke

**63,6 g.l⁻¹ fenoxaprop-P-ethyl;
63,7 g.l⁻¹ safener – mefenpyr-diethyl**

- citlivé buriny: ježatka kuria, metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka poľná, prstovka krvavá, mohár zelený
- dávka: 0,8 – 1,0 l
- má kontaktný aj systémový účinok
- aplikujte na trávovité buriny v aktívnom raste od 3 listov až do konca odnožovania (max. do fázy 1. kolienka)
- ovos hluchý vo fáze odnožovania dávka 0,8 l.ha⁻¹ a ak je ovos úplne odnožený zvýšte dávku na 1 l.ha⁻¹

Diflumax

Diflufenican 500 g.l⁻¹

- selektívny herbicíd s reziduálnym účinkom proti jednoročným dvojkličnolistovým burinám v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, tritikale, raži, pšenici jarnej a jačmeni jarom
- pôsobí na hviezdicu prostrednú, fialku roľnú, veroniku brečtanolistú, stavikrv vtáčiu, lipkavec obyčajný, hluchavku purpurovú, drchničku roľnú, kapsičku pastiersku, pohánkovec ovijavý, metličku, atď.
- dlhodobý reziduálny účinok až 6 mesiacov
- buriny vyklíčia, rýchlo zožltnú a sfarbia sa do svetlo ružova, nekrotizujú a odumierajú
- pôda by mala byť dobre pripravená s drobnohrudkovitou štruktúrou
- vlhkosť pôdy a mierny dážď zvyšuje účinok
- po aplikácii nebrániť a nevalcovať
- preemergentná aplikácia v dávke: 0,28 l.ha⁻¹
- skoro postemergentná aplikácia v dávke: 0,28 l.ha⁻¹ (od 1. listu obilnín do začiatku odnožovania)
- pre rozšírenie spektra účinku na dvojkličnolistové buriny odporúčame kombináciu s herbicídmi PENDIFLEX 400, alebo účinnými látkami tribenuron-methyl a metsulfuron-methyl.
- neaplikujte, ak očakávate silný dážď alebo prízemné mrazy
- dávka vody 200-400 l.ha⁻¹

Vivendi 600

Clopyralid 600 g.l⁻¹

- selektívny herbicíd určený na postemergentné ničenie odolných dvojkličnolistových burín, **hlavne rumanov, rumančekov a pichliača roľného**
- účinná látka je prijímaná listami a byľami rastlín, následne prenášaná do koreňov
- buriny krátko po postreku zastavujú rast, blednú, skrúcaju sa, v priebehu 10-21 dní hynú
- ostatné citlivé buriny – púpava lekárska, chryzantémovka siatinová, starček obyčajný a ďalšie buriny z čeľade astrovité, mlieč zelinný
- aplikujeme na jar v štádiu od dvoch listov (BBCH 12) až do štádia 3. kolienka (BBCH 33)
- VIVENDI 200 je vhodný do TM, s prípravkami na báze MCPA, MCPP alebo fluroxypyru
- aplikačná dávka 0,12 l.ha⁻¹
- dávka vody 200-400 l.ha⁻¹

Granos

florasulam 100 g.l⁻¹



- selektívny herbicíd so systémovým účinkom vo forme SC – do rastliny vniká cez listy – krátko po ošetroení inhibuje vývoj burín
- za optimálnych podmienok teplo a vlhko buriny hynú do 7–10 dní. V prípade chladu (teplota cca 4°C) odumierajú za 3 týždne
- aplikácia 1x/vegetáciu možná na jeseň alebo na jar
- dávka 0,05 l.ha⁻¹



Toluron

Chlorotoluron 500 g.l⁻¹

- selektívny herbicídny prípravok určený na ničenie metličky, psiarky a dvojkličnolistových burín v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, raži a tritikale
- citlivé buriny: psiarka roľná, metlička obyčajná, lipnica ročná, láskavec ohnutý, ruman roľný, mrlík biely, rumančeky, parumanček nevoňavý, konopnica napuchnutá, hluchavky, stavikrky, kolenec roľný, hviezdica prostredná, peniažtek roľný.
- dávka 1,5 – 3 l.ha⁻¹
- aplikujte v obilninách na jeseň preemergentne (BBCH 00–09) alebo postemergentne od plného vývinu 3 listov obilniny (BBCH 13) príp. postemergentne na jar do konca odnožovania obilniny (BBCH 29).
- maximálny počet aplikácií: 1x za vegetáciu
- dávka vody 200–300 l.ha⁻¹
- menej významné použitie: mak a facélia

Diflumax

Diflufenican 500 g.l⁻¹

- systémový herbicíd vo forme SC
- kontrola jednokličnolistových a dvojkličnolistových burín.
- kontrola metličky obyčajnej v pšenici ozimnej a jačmeni ozimnom
- reziduálny účinok za priaznivých podmienok až 8 týždňov po aplikácii
- prípravok je absorbovaný výhonkami klíčiacych semien
- 1x aplikácia možná v termíne PRE (BBCH00–09) alebo EPOST (BBCH 10–21)

Aliberon

750 g.kg⁻¹ tribenuron-methyl

- osvedčená účinná látka, tolerantná ku všetkým obilninám neobmedzuje následné pestovanie ľubovoľných plodín
- široký záber na dvojkličnolistové buriny (hviezdica, hluchavky, rumančeky, repka...)
- vynikajúca manipulácia a dávkovanie vďaka nadčasovej formulácii herbicídu
- jarná samostatná aplikácia 20 g.ha⁻¹
- pri jarnom silnom tlaku mrlíkov, pohánkovca ovíjaveho, slnečnice a pichliača roľného TM vhodná kombinácia s prípravkom Agritox 50 SL
- registrácia Aliberonu umožňuje jeho použitie s pôdnymi jesennými reziduálnymi herbicídmi, napr. kombinácia Delfín 0,2 l.ha⁻¹ plus Aliberon 15 g.ha⁻¹, výrazne sa zväčší aplikačné okno a komplexnosť ošetroenia a minimalizujete nutnosť jarných opráv.



Kaput New

Glyphosate 180 g.l⁻¹

- systémový neselektívny herbicíd, určený na ničenie širokého spektra jednoročných a trváčich dvojkličnolistových burín a tráv v kukurici, na nepoľnohospodárskej pôde, na strnisku a v jadrovinách
- patentovaná BGT® technológia („Better Glyphosate Technology“) umožňuje znížiť dávku účinnej látky (glyphosate) na **polovicu** pri zachovaní rovnakej účinnosti
- dávka 1,5 – 6,0 l.ha⁻¹
- maximálny počet aplikácií: 1x za vegetáciu
- nižšia dávka vody (100–150 l.ha⁻¹) zvyšuje účinnosť prípravku



Shepherd Solo

Boscalid 500 g.l⁻¹

- systémový fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC)
- účinná látka zo skupiny karboxamidov (SDHI) je absorbovaná listami a v rastline je rozvádzaná akropetálne pletivami rastliny
- určený na ochranu pšenice a jačmeňa proti hubovým chorobám
- steblolam, septoriózy, hrdze, hnedá škvrnitosť
- použitie od začiatku predĺžovacieho rastu až do konca metania (pri steblolame do vzniku 2. kolienka)
- dávka 0,7 l.ha⁻¹, aplikujeme pri prvých príznakoch infekcie alebo podľa signalizácie 1x za vegetáciu plodiny
- pôsobí preventívne ako aj kuratívne
- z hľadiska antirezistentnej stratégie, je vhodným TM komponentom PROBUS, TEBUFLEX 500 alebo CHAMANE

Boskal Pro

Boscalid 233 g.l⁻¹; Prothioconazol 100 g.l⁻¹

- systémový fungicíd vo forme SC
- prothioconazol veľmi dobrá účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhá doba trvania účinku
- v pšenici ozimnej možné až 2 aplikácie za vegetáciu s odstupom 14 dní
- široké obdobie použitia
- septoriózy a hrdza pšenícová v BBCH 30–59
- fuzariózy BBCH 39–59

Maganic

Prothioconazole 175 g.l⁻¹; Difenoconazole 125 g.l⁻¹

- systémovo pôsobiaci fungicíd na ochranu ozimných a jarných obilnín proti chorobám listov aj klasov v dávke 0,8–1,0 l.ha⁻¹
- prípravok má preventívny a aj kuratívny účinok proti širokému spektru hubových patogénov.
- prothioconazol pôsobí stimulačne čím podporuje zvýšenie úrody
- v pšenici, raži a tritikale aplikovať v T2 až T3 preventívne alebo ihneď pri zistení príznakov od fázy vlajkového listu až do konca kvitnutia BBCH 39 – 69

Chamane

Azoxystrobin 250 g.l⁻¹

- systémovo a translaminárne pôsobiaci fungicíd, registrovaný do všetkých obilnín
- účinkuje proti väčšine významných chorôb (septoriózy, hrdze, černe, ryňospóriová a hnedá škvrnitosť jačmeňa)
- aplikuje sa pred alebo na začiatku infekcie
- vyznačuje sa dlhodobým účinkom, po dobu 3–8 týždňov
- vynikajúci partner do TM zmesí s ďalšími fungicídmi
- aplikčná dávka 1 l.ha⁻¹
- dávka vody 100 – 300 l.ha⁻¹, podľa hustoty porastu
- počet aplikácií max. 2x za sezónu, interval medzi aplikáciami min. 14 dní

Protebo

Prothioconazole 125 g.l⁻¹; Tebuconazole 125 g.l⁻¹

- kombinácia vhodne sa dopĺňajúcich plne systémových fungicídnych účinných látok dosahujúcich vynikajúce výsledky v boji proti chorobám obilnín
- široký aplikačný termín, účinkuje na choroby piat stebiel, listové škvrnitosti obilnín
- pri obilninách v dávke 0,8 l/ha špecialista na riešenie komplexu klasových chorôb
- použitie zmáčadla Silwet Gold výrazne zvyšuje účinnosť



Probus

Prothioconazole 250 g.l⁻¹

- systémový fungicíd s preventívnym a kuratívnym pôsobením určený na ochranu pšenice ozimnej a repky ozimnej proti hubovým chorobám
- prothioconazole patrí do chemickej skupiny triazolthio- linov a na škodlivé organizmy pôsobí inhibíciou tvorby ergosterolu
- podobne ako strobiluríny pôsobí stimulačne a tým podporuje zvýšenie úrody
- v obilninách je registrovaný proti hrdzi pšeničnej, septorióze plevovej a fuzariózam
- dávka 0,8 l.ha⁻¹
- maximálny počet aplikácií: 2x za vegetáciu
- dávka vody: 200–500 l.ha⁻¹
- interval medzi aplikáciami 14–21 dní

Probus Plus

Prothioconazole 250 g/l

- systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu pre obilniny v dávke 0,8 l.ha⁻¹
- prothioconazol – dobrá účinnosť na široké spektrum hubových patogénov a dlhá doba trvania účinku
- jačmeň jarný – hrdza jačmenná, múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa (BBCH 30–59)
- pšenica ozimná aj jarná – fuzariózy klasov (BBCH 61–65) a septorióza plevová (BBCH 30–59)
- pšenica ozimná, tritikale (ozimné aj jarné), raž (ozimná aj jarná) – steblolam (BBCH 25–31), múčnatka trávová, septorióza pšenice (BBCH 30–59)
- v obilninách proti múčnatke trávovej a hnedej škvrnitosti jačmeňa: 1 aplikácia za vegetáciu plodiny, inak 2x za vegetáciu v intervale 10 dní

Tebuflex

Tebuconazole 500 g.l⁻¹

- systémový fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC)
- určený na ochranu pšenice ozimnej, tritikale, raže, jačmeňa jarného a repky ozimnej proti hubovým chorobám
- preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok
- široké spektrum chorôb (múčnatka, septoriózy, hrdze, hnedá škvrnitosť,...)
- použitie vo všetkých obilninách
- použitie od predĺžovacieho rastu až do konca klasenia
- dávka 0,5 l.ha⁻¹, aplikujeme pri prvých príznakoch infekcie, alebo podľa signalizácie
- vysoká návratnosť vynaložených prostriedkov na aplikáciu

INSEKTICÍDY A POMOCNÉ LÁTKY

Delta Expert

Deltamethrin 100 g.l⁻¹



- insekticídny prípravok na báze svetlostabilného pyretroidu, s dotykovým a požerovým účinkom
- vošky ako vektory viróz v dávke 0,05 l/ha, jesenná aplikácia v BBCH11–21
- proti pestričke pšeničnej v dávke 0,062 l/ha na jar v BBCH 21–29
- vošky v klasoch – dávka 0,062 l/ha, ošetriť vo fáze BBCH57–83, keď je 70% klasu vyrasteného

Silwet Gold

Polyalkyleneoxid heptamethyl trisiloxane (80 %)
Allyloxypolyethyleneglycol (20 %)

- neiónové organosilikónové zmáčadlo s vysokoúčinnou schopnosťou znížiť povrchové napätie postrekovej kvapaliny
- zabezpečuje rovnomerné rozptýlenie postreku
- rýchly prienik do rastliny
- mimoriadne bezpečný pre rastliny
- najbežnejšia dávka je 0,1 l.ha⁻¹, (povolená od 0,025 do 0,15 l.ha⁻¹)

Gondor

Lecitin 495 g.l⁻¹

- adjuvant pre použitie v zmesi s herbicídmi a regulátormi rastu
- registrácia vo všetkých plodinách, na ornej, lesnej a nepoľn. pôde vrátane železníc
- zvyšuje príľnavosť a rozprestretie postrekovej zmesi
- zvyšuje penetráciu a translokáciu aplikovaných pesticídov
- znižuje nežiaduci úlet pri aplikácii postrekovej zmesi
- dávka 0,25-0,4 l.ha⁻¹, (max konc. 0,25 %)
- dávka vody: 100-200 l.ha⁻¹ pri dávke 0,25 l.ha⁻¹ nad 200 l.ha⁻¹ pri dávke 0,4 l.ha⁻¹
- **pri príprave postrekovej zmesi dávajte adjuvant prvý**



RASTOVÉ REGULÁTORY A LISTOVÉ HNOJIVÁ

Celstar 750 SL

Chlormequat 750 g.l⁻¹

- regulátor rastu obilnín
- účinkuje systémovo, prijímaný je listovou plochou
- ovplyvňuje predĺžovací rast, skracuje a zosilňuje internódiá, podporuje odnožovanie
- pšenica ozimná – proti poliehaniu, BBCH 25-30 dávka 1,5 l.ha⁻¹
- jačmeň jarný – podpora odnožovania, BBCH 14-23 dávka na ha 1,0-1,5 l
- ošetrené porasty neskrmovať na zeleno, nesilážovať a nesenážovať
- pozor na popoludňajšie vysoké teploty

Nexa 500 SC

Trinexapac 444,3 g.l⁻¹, t.j. vo forme trinexapac-ethyl v obsahu 500 g.l⁻¹

- regulátor rastu obilnín určený na skrátenie stebľa a zväčšenie odolnosti proti poliehaniu
- maximálne 1 ošetrovanie za vegetáciu
- v pšenici ozimnej a raži ozimnej je možná aj delená aplikácia v dávke 0,15 l.ha⁻¹
- účinok prípravku zvyšuje teplota 10–15°C, silná expozícia, intenzívny rast rastlín, sucho, jasné alebo mierne zamračené počasie
- účinok znižuje teplota pod 5°C, vysoká vlhkosť v poraste, silná oblačnosť

Azosped Amino

Zloženie: N 300 g.l⁻¹, vo vode rozpustný oxid horečnatý 33 g.l⁻¹; vo vode rozpustný oxid sírový 68 g.l⁻¹, aminokyseliny 5 % hmotnostných

- dávka 3–5 l.ha⁻¹ + dávka vody minimálne 100 l.ha⁻¹
- aplikovať od otvorenia vlajkového listu do kvitnutia (objavenie klasu)
- obsahuje dve formy dusíka s rýchlejšim a pozvoľným uvoľňovaním
- možná aplikácia s fungicídmi
- balenie 10 l kanistre



Alicuprin



Zloženie: Cu – 377,5 g.l⁻¹

- koncentrované meďnaté hnojivo
- meď zvyšuje stabilitu chlorofylu a predlžuje obdobie aktívnej fotosyntézy
- nedostatok medi znižuje využiteľnosť dusíka z hnojív
- aplikujeme počas vegetácie na list, maximálne do obdobia 4 týždne pred zberom
- dávka 0,2 – 0,5 l.ha⁻¹, pri použití min. 200 l vody

Cerefol Multi

Zloženie: N 55 g.l⁻¹ (močovínový), MgO 260 g.l⁻¹, Cu 50 g.l⁻¹, Mn 130 g.l⁻¹, Zn 80 g.l⁻¹

- hnojivo CE; dávka 1 – 2 l.ha⁻¹
- jedna aplikácia od fázy 2 listov bbch 12 do fázy prvého kolienka bbch 31
- aplikáciu opakovať v prípade potreby, tj. vážneho nedostatku
- pri príprave aplikačnej zmesi, kombinovaní s ostatnými komponentmi v nádrži, cerefol multi pridávajúte po práškovo hnojive. miešanie musí byť zapnuté

Fertiamino

Zloženie: N 108 g.l⁻¹, P₂O₅ 36 g.l⁻¹, K₂O 84 g.l⁻¹, MgO 12 g.l⁻¹, B 0,48 g.l⁻¹, Cu 0,12 g.l⁻¹, Fe 0,24 g.l⁻¹, Mn 0,48 g.l⁻¹, Mo 0,048 g.l⁻¹, Zn 0,36 g.l⁻¹, Aminokyseliny 24 g.l⁻¹

- vzájomne uznané organominerálne hnojivo
- dávka 5 l/ha v maximálnej koncentrácii 5 %
- maximálne 1 aplikácia v období od steblovania bbch 30 do zdurovania pošvy vlajkového listu bbch 45
- príjem aminokyselín stimuluje zvýšenie fotosyntézy
- aminokyseliny a stopové živiny zlepšujú asimiláciu pôdou prijatých živín
- používajte na aplikáciu na list.

Thiomax Mn



Zloženie: SO₃ 1000 g.l⁻¹, Mn 41 g.l⁻¹

- hnojivo ES, moderná tekutá formulácia
- doplnenie síry v skorom jarnom období zabezpečuje vysokú úrodu a zlepšuje kvalitatívne parametre
- hnojivo má rýchly účinok
- možnosť miešania spolu s prípravkami na ochranu rastlín a listovými hnojivami (DAM)
- nízka dávka, 2-5 l.ha⁻¹
- 1 až 2 aplikácie, od konca odnožovania až do objavenia sa klasu

Fixa Mn

Zloženie: Mn 120 g.l⁻¹ rozpustný vo vode, oxid sírový 170 g.l⁻¹

- hnojivo ES
- dávka 1-2 l.ha⁻¹ (minimálna koncentrácia 1%)
- jarná aplikácia (BBCH 20–39 *steblovanie*)
- jesenná aplikácia (BBCH 10–19 *odnožovanie*), dávka vody 200 l a viac
- neaplikujte pri teplote vyššej ako 28 °C
- balenie 10 l kanistre

Fixa Zn



Zloženie: Zn 120 g.l⁻¹ rozpustný vo vode, oxid sírový 170 g.l⁻¹

- hnojivo ES
- dávka 1-2 l.ha⁻¹ (minimálna koncentrácia 1%)
- v ozimných obilninách 1 aplikácia v priebehu odnožovania až steblovania, dávka vody 200 l a viac
- v jarnom jačmeni 1 aplikácia pred metaním, dávka vody 200 l a viac
- neaplikujte pri teplote vyššej ako 28 °C

Wuxal Microplant

VITAMÍNOVÁ BOMBA!

Zloženie: N celkový 78 g.l⁻¹, K₂O 157 g.l⁻¹, MgO 47 g.l⁻¹, B 4,7 g.l⁻¹, Cu 7,9 g.l⁻¹, Fe 15,7 g.l⁻¹, Mn 23,6 g.l⁻¹, Mo 0,15 g.l⁻¹, Zn 15,7 g.l⁻¹, SO₃ 204 g.l⁻¹, kationy Fe, Cu, Mn, Zn sú v cheláte s EDTA

- špeciálne listové hnojivo s vysokým obsahom mikroprvkov
- hnojivo vhodné na odstránenie akútneho nedostatku živín a pre preventívne použitie
- aplikácia 1-2x (vo fáze odnožovania a vo fáze na začiatku klasicenia) v dávke 0,5-2,0 l.ha⁻¹

Wuxal Super

Zloženie: N celkový 99,2 g.l⁻¹ (z toho vo forme dusičnanej 28,5 g.l⁻¹, amónnej 45,9 g.l⁻¹ a močovinatej 24,8 g.l⁻¹), P₂O₅ 99,2 g.l⁻¹, K₂O 74,4 g.l⁻¹, B 0,12 g.l⁻¹, Cu 0,05 g.l⁻¹, Fe 0,25 g.l⁻¹, Mn 0,15 g.l⁻¹, Mo 0,012 g.l⁻¹, Zn 0,05 g.l⁻¹, SO₃ 27,9 g.l⁻¹, kationy Fe, Cu, Mn, Zn sú v cheláte s EDTA

- je výborne znášaný rastlinami
- je rastlinami ľahko prijímaný
- má výbornú pufrovaciu schopnosť
- možnosť kombinácií s bežnými pesticídmi
- dávka 3-5 l.ha⁻¹

Táto publikácia má informatívny charakter. Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.



Poradenstvo

Ing. Miroslav Bohunický
mobil: 00421 918 491 743
e-mail: m.bohunicky@agroaliance.sk

Ing. Ján Gajdoš
mobil: 0915 781 289
e-mail: j.gajdos@agroaliance.sk

Andrea HAJDÚKOVÁ
mobil: 0905 526 442
e-mail: a.hajdukova@agroaliance.sk

Ing. Boris Vladovič
mobil: 0917 881 042
e-mail: b.vladovic@agroaliance.sk