

# ELASTIQ® GOLD

Účinná látka: karboxylovaný styrén butadién kopolymér 455,5 g.l<sup>-1</sup>

Postrekový pasívny pomocný prostriedok vo forme emulzie typu olej vo vode (EW) určený na obmedzenie strát repky olejnej, hrachu, maku, bôbu, lupiny bielej, facélie vrtičolistej a semenných tráv pred a pri zbere a obilnín k ochrane zrna obilnín a udržaniu jeho kvalitatívnych ukazovateľov.

## PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ELASTIQ® GOLD je určený k obmedzeniu predzberových a zberových strát. Po aplikácii tvorí na povrchu ošetrených rastlín tenkú polymérnu vrstvu, ktorá na vzduchu rýchlo zasychá a vytvára trvale elastickú polopriepustnú membránu. Tá umožňuje vysychanie šesúľ a strukov, súčasne zamedzuje spätnému prenikaniu vody do pletív. ELASTIQ® GOLD obmedzuje praskanie šesúľ a strukov a vypadávanie semien, a tým znižuje predzberové a zberové straty. Pri použití v obilninách ELASTIQ® GOLD vytvára na klasoch trvalo elastickú polopriepustnú membránu, ktorá počas nepriaznivých podmienok zabraňuje prenikaniu vody do klasov a zrna v období dozrievania porastu pred zberom. Tým znižuje pravdepodobnosť napadnutia klasov hubovými chorobami, udržuje porast v optimálnom stave pred zberom a najmä priamo pozitívne ovplyvňuje kvalitatívne ukazovatele zrna pre spracovateľský priemysel vrátane pádového čísla a aj následného kľúčivého potenciálu zberaného zrna.

## NÁVOD NA POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA l.ha <sup>-1</sup>	OCHRANNÁ DOBA	POZNÁMKA
hrach, repka olejná, mak siaty, bôb, lupina biela, facélia vrtičolistá	obmedzenie strát pri zbere	0,8-1,0 l	AT	pozemne aj letecky
trávy	obmedzenie strát pri zbere	0,8 l + 1 l	AT	pozemne aj letecky
obilniny	ochrana zrna, udržanie jeho kvalitatívnych ukazovateľov	1,0 l	AT	pozemne aj letecky
slničnica	obmedzenie strát pri zbere	1,0-1,5 l	7 dní	pozemne aj letecky
horčica	obmedzenie strát pri zbere	0,5-1,0 l	7 dní	pozemne aj letecky
soja	obmedzenie strát pri zbere	0,5-1,0 l	7 dní	pozemne aj letecky

AT - ide o spôsob použitia alebo určenia, ktoré stanovenie ochrannej lehoty nevyžadujú.

## ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

### Ozimná repka

ELASTIQ® GOLD aplikujte v dobe približne 3-4 týždne pred očakávaným terminom zberu (BBCH 81) v nezaburinených porastoch. Šešule by v dobe aplikácie mali byť svetlo zelené, pružné a je možné ich ohnúť do tvaru písmena „U“ alebo „V“ bez ich prasknutia.

Pri pozemnej aplikácii použite 250-500 litrov aplikačnej kvapaliny, pri leteckej aplikácii použite 70-90 litrov aplikačnej kvapaliny na hektár.

Pri aplikácii na zaburinené porasty využite kombináciu s prípravkom KAPUT® GREEN.

### Obilniny

ELASTIQ® GOLD aplikujte vo fáze žltej zrelosti (BBCH 87).

Aplikujte pozemne alebo letecky. Pri pozemnej aplikácii použite 100-200 litrov aplikačnej kvapaliny, pri leteckej aplikácii použite 70-90 litrov aplikačnej kvapaliny na hektár.

## PRÍPRAVA APLIKAČNEJ KVAPALINY

Odmerané množstvo pomocného prostriedku sa za stáleho miešania vleje do nádrže aplikačného zariadenia naplnenej do polovice vodou, rozmieša sa a doplní vodou na predpísaný objem.

**Balenie:** 1 l HDPE fľaša, 5 l HDPE kanister