

FIXA[®] CU



CE HNOJIVO

CaO, SO₃ (5,8-11) hnojivo s obsahom mikroživiny v roztoku

Zloženie: oxid vápenatý (CaO) 78 g.l⁻¹; oxid sirový (SO₃) 146 g.l⁻¹; meď (Cu, síran meďnatý) 120 g.l⁻¹.

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

FIXA[®] Cu kvapalný koncentrát s vysokým obsahom meď vo forme síranu meďnatého na prevenciu ako aj vyrovnanie akútneho nedostatku tohto prvku v obilninách, zemiakoch, cukrovej repe a mnohých ostatných plodinách ako aj v zelenine. FIXA[®] Cu je vybavená LS formuláciou, ktorá zlepšuje aplikáciu postrekom, priľnavosť k rastlinám a zabezpečí lepšiu odolnosť voči odkvapkávaniu postrekovej kvapaliny. LS formulácia zabezpečuje vynikajúcu pokrývnosť postreku a ovlhčenie povrchu ošetrovaného porastu, ktoré je potrebné k prieniku živín do rastliny.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Hnojivo FIXA[®] Cu je povolené na použitie v organickom poľnohospodárstve v súlade s Nariadením (ES) č. 834/2007. Určený pre aplikáciu na list.

DÁVKOVANIE, ROZSAH A SPÔSOB POUŽÍVANIA:

Meď sa podieľa na mnohých biochemických procesoch v rastlinách, ako sú fotosyntéza, dýchanie, ochrana pred oxidatívnym stresom, tvorba etylénu, klíčenie peľu, rast koreňov a je súčasťou niektorých dôležitých enzýmov.

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

PLODINA	DÁVKA l.ha ⁻¹	POZNÁMKA
Obilniny	2 l/ha min. 200 l vody/ha 1 l/ha min. 200 l vody/ha	1 až 2 aplikácie od prvých štádií do klasenia (klas má dĺžku 1 cm) Po štádiu 2. kolienka
Zemiaky a cukrová repa	2 l/ha min. 200 l vody/ha	1 aplikácia po zapojení porastu
Ostatné plodiny a zelenina	2 l/ha min. 200 l vody/ha	1 až 2 aplikácie v 10 - 14 dňových intervaloch

Použiť len v prípade skutočnej potreby. Neprekročiť dávkovanie.

HNOJIVÁ

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, použite dostatočné množstvo vody až z povrchu plodiny začne stekať. Vyhnite sa postrekovaniu v čase silného slnečného žiarenia alebo pri vysokých teplotách vzduchu. Ak je to možné, aplikujte večer alebo skoro ráno, najmä ak denná teplota je vyššia ako 28° C. Veľmi mladé listy a plodiny, ktoré sú v strese môžu byť náchylnejšie na spálenie. Za týchto okolností by sa mali používať nižšie dávky a interval aplikácií primerane zredukujte. Pozrite odporúčania pre aplikačné dávky a termíny aplikácie pre jednotlivé plodiny uvedené na tejto etike. Určené pre použitie v otvorenom priestore.

Fyzikálno-chemické vlastnosti: hustota: 1,34 kg/l

PRÍPRAVA APLIKAČNEJ ZMESI:

1. Nádrž postrekovača naplňte polovicou požadovaného množstva vody a zapnite miešacie zariadenie.
2. Pridajte potrebné množstvo tohto produktu a potom pridajte zvyšok vody. Miešacie zariadenie ponechajte zapnuté. Pri miešaní s ďalšími zložkami tank-mix zmesi, tento produkt pridávajte vždy až po práškových produktoch. Nenechajte zmes stáť bez zapnutého miešacieho zariadenia.
3. Po postreku dôkladne vyčistite a opláchnite postrekovač.

Balenie: 10 L, 600 L