

CE**WUXAL® SUSPENSION KOMBI Mg**

VIACZLOŽKOVÉ KVAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROŽIVINY PFC1. (C) (I) (b) (ii)

NK (Mg, S) hnojivo s obsahom mikroživiny, 20-15 (+4+1,75). V suspenzii.

ŽIVINY:

% hmotnostné	živina
20,0	(N) dusík spolu (300 g/l)
4,3	dusičnanový dusík (64,5 g/l)
0,5	amoniakálny dusík (7,5 g/l)
15,2	močovínový dusík (228 g/l)
15,0	(K ₂ O) vo vode rozpustný oxid draselný (225 g/l)
4,0	(MgO) vo vode rozpustný oxid horečnatý (60 g/l)
1,75	(SO ₃) vo vode rozpustný oxid sírový (26,2 g/l)
0,02	(B) vo vode rozpustný bór ako kyselina boritá (0,30 g/l)
0,05	(Cu) vo vode rozpustná meď vo forme chelátu s EDTA* (0,75 g/l)
0,1	(Fe) vo vode rozpustné železo vo forme chelátu s EDTA* (1,50 g/l)
0,05	(Mn) vo vode rozpustný mangán vo forme chelátu s EDTA* (0,75 g/l)
0,001	(Mo) vo vode rozpustný molybdén ako molybdénan sodný (0,015 g/l)
0,05	(Zn) vo vode rozpustný zinok vo forme chelátu s EDTA* (0,75 g/l)

*Rozsah pH zaručujúci prijateľnú chelatačnú stabilitu: Cu-EDTA: 1,5 – 10; Fe-EDTA: 1,5 – 6,5; Mn-EDTA: 3,0 – 8,0; Zn-EDTA: 2,0 – 9,0

® = ochranná známka

ZLOŽKY:

Močovina CAS: 57-13-6 (CMC1*) Pôvodné látky a zmesi

Dusičnan draselný CAS: 7757-79-1 (CMC1*) Pôvodné látky a zmesi

Chlorid horečnatý CAS: 7791-18-6 (CMC1*) Pôvodné látky a zmesi

Použiť len v prípade skutočnej potreby. Neprekročiť dávkovanie.

POKYNY A DÁVKOVANIE:

Wuxal SUS Kombi Mg je vysoko koncentrované bezfosforové hnojivo vhodné pre aplikáciu na list. Hnojivo môže byť použité vo všetkých poľných plodinách, v ovocinárstve, zeleninárstve a v okrasnom záhradníctve, najmä vtedy, keď je v pôde k dispozícii dostatočná zásoba fosforu a rastliny majú zvýšené nároky na horčík. Použitý môže byť ako preventívne, tak aj kuratívne, po objavení príznakov nedostatku horčíka.

V obilninách je vhodné použiť Wuxal SUS Kombi Mg – 2-4x a to v období od odnožovania až do metania, dávka 3-5 l/ha.

V kukurici sa hnojivo aplikuje 3x v období medzi fázami 2-11 listov, dávka 3-5 l/ha.

V zemiakoch sa aplikuje 3x, prvýkrát na začiatku tvorby pukov (fáza 50), opakuje sa na začiatku kvitnutia a 14 dní potom. Dávka 5 l/ha.

V cukrovej a krmnej repe sa aplikuje 3-5x od fázy 4 listov do uzatvorenia riadku, dávka 5 l/ha.

Zeleninárstvo – aplikuje sa v koncentrácii 0,05-0,1 % (50-100 ml na 100 l vody) podľa potreby v kombinácii s bežnými pesticídmi.

Okrasné rastliny – aplikuje sa v koncentrácii 0,05 – 0,1 % (50 – 100 ml na 100 l vody) v kombinácii s bežne používanými pesticídmi. V mladších rastlinách a porastoch s mäkkými, jemnými listami je vhodné použiť spodnú hranicu uvedenej koncentrácie.

Chmeľ – v koncentrácii 0,15 % sa kombinuje s ošetrením proti peronospóre. Pri aplikácii s nízkym obsahom vody nesmie koncentrácia prevýšiť 0,3 %. Pri zvýšenej potrebe dávkovania zinku je možné Wuxal Sus Kombi Mg používať v zmesi so síranom zinočnatým (0,2%). Ošetruje sa 2-4x. Ošetrovanie je tiež možné kombinovať s Wuxalom Super (3-5 l/ha).

Ovocinárstvo: – aplikácia 2-3x v dávke 3-5 l/ha v kombinácii s bežne používanými pesticídmi, prvýkrát v rastovej fáze tesne pred vytvorením ružového púčika (E2). V jabloniach sa v čase po odkvete odporúča prejsť na Wuxal SUS Kombi Ca.

Vinohradníctvo – aplikácia v dávke 3-5 l/ha v kombinácii s bežne používanými pesticídmi proti peronospóre, spolu 5x.

PRÍPRAVA APLIKAČNEJ ZMESI:

Hnojivo je potrebné najskôr v obale starostlivo rozmiešať a potom cez sitko vyliať do nádrže a spláchnuť vodou. Pri rozpúšťaní je potrebné udržiavať miešacie zariadenie v činnosti. Pri príprave zmesi s pesticídmi sa do nádrže vždy vleje ako prvý WUXAL a až potom sa predpísaným postupom dávkuje príslušný pesticíd. Hnojivo je fyzikálne a chemicky miešateľné s fungicídmi aj insekticídmi, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Možnosť miešania musí byť konzultovaná s výrobcom pesticídu. Neodporúčame ho používať v zmesi so silno alkalickými postrekmi typu Bordeauxskej alebo sírovápenatej zmesi a s polysulfidmi. Pred prvým prevádzkovým ošetrením okrasných rastlín zmesou WUXALu s pesticídmi odporúčame overiť citlivosť kultúry k tejto zmesi v daných miestnych podmienkach.

PODMIENKY SKLADOVANIA:

Hnojivo je potrebné skladovať v dobre uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých zamknutých a chladných skladoch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, kyselín, lúhov, olejov a horľavých látok a obalov od týchto látok. Neskladujte v kovových obaloch (riziko korózie). Chráňte produkt pred mrazom, teplotami pod $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ a nad $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a častými zmenami teplôt, znečistením, vyschnutím,. Aj v dôsledku krátkodobého vystavenia výrobku teplotám pod $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ môže dôjsť k zmene farby a vzniku kryštálov. Táto skutočnosť nespôsobuje zníženie kvality, v priebehu prípravy aplikačnej kvapaliny sa kryštály rýchlo rozpustia. Kryštály je možné tiež rozpustiť dlhodobejším ponechaním výrobku pri teplotách okolo $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ pri občasnom premiešaní alebo pretrepaní.

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNOM PROSTREDÍ:

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie. (tel.: 046 540 05 01)

Toto hnojivo obsahuje močovinu, ktorá môže uvoľňovať amoniak a mať vplyv na kvalitu ovzdušia. V závislosti od miestnych podmienok sa musia prijať vhodné nápravné opatrenia.

S cieľom vyhnúť sa rizikám pre ľudské zdravie a životné prostredie dodržiavajte odporúčaný návod na použitie tohto produktu na hnojenie. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

PRVÁ POMOC:

Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti, alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety alebo príbalového letáku.

Pri nadýchaní:

Prerušte expozíciu, zabezpečte telesný a duševný pokoj.

Pri zasiahnutí pokožky:

Vyzlečte znečistený odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte podľa možnosti teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite. V prípade príznakov podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí očí:

Pri otvorených viečkach vyplachujte najmä priestory pod viečkami čistou pokiaľ možno vlažnou tečúcou vodou. Ak pretrvávajú príznaky (začervenanie, pálenie) bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc (zaistite odborné lekárske ošetrenie). Kontaktné šošovky ak ich postihnutý používa pred ošetrením oka odstráňte a zlikvidujte. Kontaminované kontaktné šošovky sa nesmú opätovne používať.

Pri náhodnom požití:

Ústa vypláchnite vodou (len za predpokladu, že postihnutý je pri vedomí a nemá kŕče); nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok / etiketu popr. obal hnojiva alebo kartu bezpečnostných údajov.

Lekára vždy informujte o hnojive, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. Terapiu možno v prípade potreby konzultovať s toxikologickým strediskom:

Národné toxikologické informačné centrum (TIC), Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava. Telefón 24-hodinovej konzultačnej služby pri akútnych intoxikáciách: +421 2 547 741.

Množstvo: objem balenia: 10 L; čistá hmotnosť: 15 kg

Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby

Dátum výroby: uvedené na obale

Číslo šarže: uvedené na obale

Distribútor: AGRO ALIANCE SK, s.r.o. ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, tel.: 046/55 00 501

Výrobca: AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG, Heerdter Landstr. 199, D-40549 Düsseldorf, Nemecko. Telefón: +49 (0) 2 11/50 64 237

OZNAČENIE:

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa Nariadenia 1272/2008/ES (CLP)

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.