

FERTIAMINO®

Organominerálne NPK kvapalné hnojivo s obsahom aminokyselín a mikroživín

Zloženie: Dusík (N) spolu 108,5 g.l⁻¹, oxid fosforečný (P₂O₅) 36,2 g.l⁻¹, oxid draselný (K₂O) 84,4 g.l⁻¹, oxid horečnatý (MgO) 12,05 g.l⁻¹, bór (B) 0,48 g.l⁻¹, meď (Cu) 0,12 g.l⁻¹, železo (Fe) 0,24 g.l⁻¹, mangán (Mn) 0,48 g.l⁻¹, molybdén (Mo) 0,05 g.l⁻¹, zinok (Zn) 0,36 g.l⁻¹, celkové aminokyseliny 24,1 g.l⁻¹.

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

PLODINA	DÁVKA l.ha ⁻¹	POZNÁMKA
Poľné plodiny Obilniny	5 l/ha (maximálna koncentrácia zmesi 5 %)	Maximálne 1 aplikácia Od steblovania do zdurovania pošvy vlajkového listu Od objavenia sa vlajkového listu
Olejníny, cukrová repa	5 l/ha (maximálna koncentrácia zmesi 5 %)	3-4 aplikácie v intervale 15 dní kedykoľvek v priebehu vegetácie
Zemiak	5 l/ha (maximálna koncentrácia zmesi 5 %)	3-4 aplikácie v intervale 15 dní od začiatku tvorby hlúz
Zelenina	5 l/ha (maximálna koncentrácia zmesi 5 %)	3-4 aplikácie v intervale 15 dní od začiatku vegetatívneho rastu
Ovocné stromy, škôlky	5 l/ha (maximálna koncentrácia zmesi 5 %)	4 aplikácie v intervale 15 dní od opadu korunných lupienkov
Vinič	5 l/ha (maximálna koncentrácia zmesi 5 %)	3-4 aplikácie v intervale 15 dní Od štádia oddeľovania kvetných zväzkov, začiatkom kvitnutia a pred uzatváraním strapcov

Prijem aminokyselín stimuluje zvýšenie fotosyntézy. Aminokyseliny a stopové živiny zlepšujú asimiláciu pôdou prijatých živín. Používajte na aplikáciu na list.

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite dostatočné množstvo vody až z povrchu plodiny začne kvapkať. Vyhybajte sa postreku v čase silného slnečného žiarenia a/alebo vysokých teplôt vzduchu. Pokiaľ je to možné, aplikujte večer alebo skoro ráno, najmä v prípade, keď denná teplota prekročí 28 °C. Veľmi mladé listy a plodiny ktoré sú v strese môžu byť náchylnejšie na spálenie. Za týchto okolností používajte nižšie dávky a primerane zredukujte aplikačný interval. Pozri plodinové odporúčanie aplikačnej dávky a aplikačných termínov uvedené na tejto etike pre jednotlivé plodiny. Len na vonkajšie použitie.

PRÍPRAVA APLIKAČNEJ ZMESI

Vždy si prečítajte štítok produktu a dodržujte uvedené pokyny výrobcov pre všetky produkty. Niektoré použitia, mimo kontroly výrobcu alebo distribútora, môžu mať vplyv na kvalitu produktov aplikovaných v tank-mix. Preto za výsledok tank-mix aplikácie zodpovedá koncový používateľ. Pri miešaní s ďalšími zložkami v tank-mix pridávajte tento produkt vždy ako posledný. V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na výrobcu alebo distribútora.

Balenie: 10 l kanistre