

# BOA<sup>®</sup> 360 CS

Účinná látka: clomazone 360 g.l<sup>-1</sup>

HERBICÍDY

**BOA<sup>®</sup> 360 CS** je herbicíd vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou, určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v repke ozimnej.

## PÔSOBNIE PRÍPRAVKU

Prípravok BOA<sup>®</sup> 360 CS je pôdny herbicíd ktorý ničí buriny hlavne vo fáze klíčenia. Účinná látka clomazone preniká do rastlín koreňmi a u citlivých druhov inhibuje biosyntézu prekursorov chlorofylu a karotenoidov. Listy citlivých rastlín alebo klíčiace rastliny ošetrované prípravkom sú vybielené. Herbicídny účinok možno pozorovať v priebehu 7 dní od objavenia sa burín. Rýchlosť účinku závisí od rastovej fázy likvidovaných burín, atmosférických podmienok - teploty, vlhkosti vzduchu a rýchlosti rastu burín.

## SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

**Citlivé buriny:** lipkavec obyčajný, pakost nízky, hviezdica prostredná, mrlík biely, parumanček nevoňavý, kapsička pastierska, peniažtek roľný.

**Stredne citlivé buriny:** nevädza poľná

**Odolné buriny:** pýr plazivý, fialka roľná, metlička obyčajná.

## NÁVOD NA POUŽITIE

| PLODINA      | ŠKODLIVÝ ČINITEL         | DÁVKA<br>l.ha <sup>-1</sup> | OCHR.<br>DOBA | POZNÁMKA |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|----------|
| repka ozimná | dvojklíčnolistové buriny | 0,33 l                      | AT            |          |

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-300 l/ha.

Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1 ×.

**Odporúčané postrekovanie:** kvapky strednej veľkosti

Aplikujte v priebehu troch dní od výsevu repky na jemne skyprenú pôdu bez hrúd, s vlhkým a zarovnaným sejbovým lôžkom. Sypké a hrudkovité osevné plochy je pred aplikáciou potrebné spevniť valcovaním alebo inou kultiváciou

Použitie prípravku si vyžaduje dobré agrotechnické podmienky a správne postupy (kvalitná príprava pôdy, výsev semien do rovnakej hĺbky a ich dôkladné zakrytie, dostatočná vlhkosť pôdy a pod.)

Prípravok je vhodný na použitie na všetkých typoch pôd, na ktorých sa pestuje repka.

Sucho alebo zrážky, ktoré sa vyskytnú v priebehu ošetrovania alebo krátko po ňom, znižujú prijímanie a účinnosť prípravku.

**Prípravok nepoužívajte:**

- počas vzchádzania a po vzídení repky vzhľadom na riziko jej poškodenia,
- pri vetre, ktorý môže spôsobiť zasiahnutie susediacich plodín postrekovou kvapalinou,
- v prípade príliš vlhkých alebo presušených pôd,
- pomocou vysokotlakových postrekovačov,
- v prípade, ak postrekovou kvapalinou môžu byť zasiahnuté stromy a kry, ktoré rastú pri cestách.

Neaplikujte letecky!

**Pri používaní prípravku zabráňte:**

- stekaniu aplikačnej kvapaliny na poľnohospodárske rastliny v ich blízkosti,
- prekryvaniu aplikačnej kvapaliny v postrekových pásoch a na úvratiach.

**Upozornenie**

Prípravok sa v priebehu vegetačného obdobia v pôde rozloží bez rizika pre následné plodiny. Pestovanie následných plodín bez obmedzenia, pred ich sejbou však odporúčame minimálne strednú orbu.

**Náhradné plodiny po aplikácii BOA 360 CS v dávke 0,33 l/ha na konci leta:**

1. Po orbe do hĺbky 27 cm
  - repka ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, bôb - 45 dní po aplikácii
  - repa cukrová, slnečnica, kukurica, ďatelina, jačmeň jarný, pšenica jarná - 6 mesiacov po aplikácii
2. Po príprave pôdy do hĺbky 7-10 cm (rotačné brány)
  - repka ozimná, bôb, kukurica
  - pšenica jarná, jačmeň jarný, ďatelina, repa cukrová, slnečnica - u týchto plodín môže dochádzať k dočasným miernym prejavom vybielenia listov
  - nemôžu sa vysievať - pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale

Pri sebbe náhradných plodín (po prípadnom zaoraní repky ozimnej na jar) môže dôjsť k chlorózam na listoch (ktoré sú však dočasné) a to len pri citlivých plodinách ako ďatelina, lucerna, mak, repa cukrová.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny a plochy, na ktorých rastú cieľové rastliny. Kontakt postrekovej hmly alebo výparov s listami môže zapríčiniť u citlivých rastlín ich vybielenie alebo zožltnutie. Symptómy sú všeobecne prechodné, u niektorých druhov môžu pretrvávať.

**Balenie:** 1 l fľaša