

ODPORÚČANIA PRE OŠETRENIA CUKROVEJ REPY A KU KOMBINÁCIÁM PRÍPRAVKOV

1. V prípade výskytu jednoročných tráv alebo pýru je možné prípravky firmy Agro Alliance kombinovať s graminicidom RANGO® SUPER v dávke 1,0-1,5 l.ha⁻¹ proti jednoročným trávam a v dávke 2,5 l.ha⁻¹ proti pýru (pri aplikácii proti pýru môžeme použiť aj delenu aplikáciu 2-krát 1,25 l.ha⁻¹ RANGA® SUPER). Pri použití iných registrovaných graminicidov je potrebné ich aplikáciu konzultovať so zástupcami výrobcov jednotlivých produktov.
2. V prípade výskytu pichliača používame výrobok VIVENDI® 200 na báze clopyralidu podľa špecifických odporúčaní pre použitie tejto účinnej látky v cukrovej repe.
3. Herbicidy firmy Agro Alliance je možné kombinovať v rámci BETANAL® systému:
4. V prípade potreby zvýšenia účinnosti jednotlivých prípravkov v kombináciach v T-1 až T-3
 - a) posilnenie účinku na horčiak, lipkavec, bažanku a citl. jedn. trávy a pôdneho účinku s prípravkom STEMAT® SUPER v dávke 0,2-0,5 l.ha⁻¹
 - b) posilnenie účinku na láskavce a prerastené buriny prípravkom DESTOR® v dávke 0,3-3,0 l.ha⁻¹
 - c) posilnenie pôdneho účinku prípravkom TOPCAT® v dávke 0,3 (T1)-0,6 (T2, T3) l.ha⁻¹, METAFOL® 700 SC v dávke 1,0-2,0 l.ha⁻¹.
 - d) letné zaburinenie prípravkom VENZAR® 500 SC v dávke 0,2-0,5 l.ha⁻¹
 - e) ničenie pichliača roľného podľa príslušných odporúčaní prípravkom VIVENDI® 200
5. Prípravok BETAFLEX® zaraďujeme do aplikačného sledu na posilnenie účinku proti láskavcom a pri výskyte abutilonu v dávke 0,015-0,02 (T1)-0,03 (T2, T3) l.ha⁻¹.
6. V ošetrovaniach je možné použiť:
 - a) zmáčadlo TREND® 90 s prípravkom BETAFLEX® v dávke 0,1 až 0,2 l.ha⁻¹
 - b) adjuvant GONDOR® v dávke 0,2-0,25 l.ha⁻¹

APLIKÁCIA PRÍPRAVKOV V CUKROVEJ REPE

Buriny v cukrovej repe vzhádzajú vo vlnách. Pri ošetrovaní cukrovej repy je potrebné klásť dôraz na včasnosť a kvalitu aplikácií.

Prvá aplikácia sa vykonáva pri objavení sa prvých burín, teda v štádiu kľúčnych lístkov.

Druhá postemergentná aplikácia herbicidov má za úlohu zničiť buriny vzídené po prvej aplikácii a „doraziť“ poškodené buriny, ktoré prvá aplikácia celkom nezničila. Vykonáva sa 5-9 dní po prvej aplikácii, keď vznikne nové zaburinenie a prvé lístky druhej vlny burín majú kľúčne lístky. Ak bola prvá aplikácia 100% účinná, s druhou počkáme na vzídenie novej vlny burín. Pokiaľ prvá aplikácia nespĺnila svoj účel (zmytie dažďom, prerastené buriny, chybná aplikácia, nevhodná kombinácia trysiek a tlaku a pod.), je potrebné druhú aplikáciu zopakovať za 3-5 dní a to úmerne zvýšenou dávkou. Pri zvýšení dávky vychádzame z poškodenia či nepoškodenia burín pri prvej aplikácii.

Tretia postemergentná aplikácia sa vykonáva na vzídené buriny zväčša za 10-14 dní po úspešnej druhej aplikácii. K tejto tretej aplikácii je účelné pridávať herbicid proti letnému zaburineniu. Proti letnému zaburineniu musíme intenzívne bojovať od začiatku vegetácie, hlavne dôsledným použitím pôdnych herbicidov v druhej a tretej postemergentnej aplikácii.