

# OPUS<sup>®</sup> TOP

Účinná látka: epoxiconazole 84 g.l<sup>-1</sup>  
fenpropimorph 250 g.l<sup>-1</sup>

Fungicíd so systémovým účinkom vo forme suspenznej emulzie určený na ošetrovanie pšenice proti múčnatke trávovej, hrdziam a septoriózam a ošetrovanie jačmeňa proti múčnatke trávovej, hrdzi jačmennej a rynchospóriovej škvrnitosti.

## PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

OPUS<sup>®</sup> TOP je systémovo a kontaktné pôsobiaci fungicíd, ktorý je prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikátnym pôsobením proti hubovým chorobám obilnín.

Prípravok obsahuje dve účinné látky: epoxiconazole a fenpropimorph.

Epoxiconazole patrí medzi DMI fungicídy, do skupiny triazolov, ktoré ako inhibítory demetylácie ovplyvňujú biosyntézu sterolu v membránach. Pôsobí na kľúčiace spóry, na rast infekčného mycélia a na jeho nadmerné vetvenie, pričom tento proces prebieha veľmi rýchlo a progresívne. Okrem menovaných účinkov táto účinná látka vyvoláva zvýšenú obrannú reakciu hostiteľskej rastliny po jej ošetrovaní.

Fenpropimorph patrí do skupiny morfolinov. Táto účinná látka je zaradená do skupiny heterocyklických látok, inhibujúcich biosyntézu sterolov, ktoré sú pre huby nevyhnutné. Morfoliny sú charakteristické systémovým účinkom a širokým spektrom účinku. Systémová aktivita sa prejavuje eradikátnym pôsobením v pletivách rastlín vzdialených od miesta aplikácie.

## NÁVOD NA POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA l.ha <sup>-1</sup>	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
pšenica ozimná, pšenica jará	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	1 l	35 dní	je možná LA*)
jačmeň ozimný, jačmeň jarý	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	35 dní	je možná LA*)

\*) pri LA dávka vody: 40-70 l.ha<sup>-1</sup>

## ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l.ha<sup>-1</sup>

Počet aplikácií: max 2x za sezónu

Interval medzi aplikáciami: 21 dní

Aplikujte preventívne, najneskôr pri prvých príznakoch choroby.

Proti múčnatke trávovej na obilninách ošetrojte pri prvých príznakoch napadnutia, od 2.

kolienka až do konca klasenia najneskôr do začiatku kvitnutia (BBCH 32-59 ). Jačmeň ozimný je možné ošetriť už aj na jeseň. Pri silnom napadnutí ošetrovanie opakujte. Proti hrdziam a ostatným chorobám ošetrojte pri zistení prvých príznakov napadnutia až do začiatku kvitnutia. Neaplikujte pri teplotách vyšších ako 22 °C a pri predpoklade dažďa do dvoch hodín po aplikácii.

Prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty!

#### Upozornenie

Nie sú známe žiadne prejavy fytotoxicity. Neaplikujte prípravky s rovnakými účinnými látkami niekoľkokrát za sebou.

**Balenie:** 0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l HDPE/PA fľaša  
3 l, 5 l, 10 l HDPE/PA kanister