

# ORNAMENT® 250 EW

Účinná látka: tebuconazole 250 g.l<sup>-1</sup>

**Systémový fungicíd vo forme emulzie typu olej vo vode určený na ochranu viniča, repky, kôstkovín a pšenice ozimnej proti hubovým chorobám.**

## PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ORNAMENT® 250 EW obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku tebuconazole. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku. Vo viniči vykazuje výraznú vedľajšiu účinnosť proti Botrytis cinerea. V ozimnej repke okrem účinku proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) a čerň repkovej (Alternaria brassicae) pôsobí aj proti fómovej hnilobe (Phoma lingam). Prípravok vykazuje aj rastovo regulačný efekt, ktorý v prípade jesenného použitia zabraňuje vybiehaniu rastlín, čím zvyšuje odolnosť repky voči vymrznutiu a zabezpečí jej lepšie prezimovanie. Jarná aplikácia zvyšuje odolnosť rastlín proti poliehaniu.

## NÁVOD NA POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA l.ha <sup>-1</sup>	OCHRANNÁ DOBA
vinič	múčnatka viniča	0,4l (0,04%)	28
repka	biela hniloba, čerň repková	1 l	56
kôstkoviny – slivka, čerešňa, višňa	monilióza kôstkovín	0,75 l	21
pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,8l	35

## ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

**Vinič:** proti múčnatke viniča (Uncinula necator) ošetríte od začiatku signalizácie v intervale 10-14 dní podľa stupňa ohrozenia porastu. Aplikáciu ORNAMENTU® 250 EW odporúčame vykonať maximálne 3-krát za vegetáciu. V prípade potreby boja proti peronospóre kombinujte ORNAMENT® 250 EW s prípravkom FANTIC® F.

**Repka:** v repke proti bielej hnilobe aplikujte prípravok pri začínajúcom opade korunných lupienkov (BBCH 67) Proti alternárieovej škvrnitosti (čerň repková) aplikujte prípravok pri prvých príznakoch choroby, najneskôr do štádia dokvitania (BBCH 69). Jesenná aplikácia pri BBCH 12-14 má vedľajší účinok proti fómovej hnilobe. Dávka vody 300-400 l.ha<sup>-1</sup>.

**Kôstkoviny:** prvé ošetrovanie vykonajte na začiatku kvitnutia, druhé pri dokvitaní.

**Pšenica:** ošetrovanie proti múčnatke a hrdziam vykonávame pri zistení prvých príznakov infekcie, najneskôr na začiatku kvitnutia (BBCH 61). Proti septorióze pšenice ošetrujeme na začiatku steblovania (BBCH 21-30).

**Prípravok je možné aplikovať aj letecky!!!**

**Balenie:** 5 l PE kanister