

SPORTAK® EW

Účinná látka: Prochloraz 450 g.l⁻¹; 39,82 % hmot.

Postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom vo forme emulzie typu olej-voda (EW), určený na ošetrovanie ozimných obilnín proti steblolamu na pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, ovse ozimnom, raži ozimnej a tritikale; proti septoriózam na pšenici ozimnej a tritikale; proti rynchospóriovej škvrnitosti, hnedej škvrnitosti jačmeňa a hnedej pružkovitosti jačmeňa na jačmeni ozimnom.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

SPORTAK® EW je fungicíd s lokálne systémovým účinkom, preniká do rastlinných pletív, ale nie je rozvádzaný do neošetrovaných častí rastliny. Patrí do skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu.

NÁVOD NA POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL'	DÁVKA l.ha ⁻¹	OCHRANNÁ DOBA	POZNÁMKA
pšenica ozimná	septorióza pšenice, septorióza plevová, steblolam	1 l	35 dní	
jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť, hnedá pružkovitosť jačmeňa, steblolam	1 l	35 dní	
raž ozimná, ovos ozimný	steblolam	1 l	35 dní	
tritikale	septorióza plevová, septorióza pšenice, steblolam	1 l	35 dní	

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l.ha⁻¹.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 2x.

Min. interval medzi aplikáciami: 21 dní.

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, ovos ozimný, tritikale - steblolam

Ošetríte pri prvých príznakoch choroby, obvyčajne vo fáze keď je 1. kolienko min. 1 cm nad odnožovacím uzlom, do štádia zástavnicového listu: zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný (BBCH 31-39).

SPORTAK® EW ničí steblolam (*Pseudocercospora herpotrichoides*) a ničí aj kmene rezistentné k benzimidazolovým fungicidom. Krížová rezistencia medzi benzimidazolmi a prochlorazom nebola doposiaľ pozorovaná.

Pšenica ozimná – septorióza pšenice, septorióza plevová.

Ošetrovanie vykonávajú od štádia zástavnicového listu: zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný až do štádia konca klasenia: klas celkom vyrastený (BBCH 39-59).

Jačmeň ozimný – hnedá škvrnitosť jačmeňa, hnedá pružkovitosť jačmeňa a rynchospóriová škvrnitosť.

Ošetrovanie vykonávajú obvyčajne pri prvom výskyte príznakov choroby, od štádia keď je 1. kolienko min. 1 cm nad odnožovacím uzlom, do štádia zástavnicového listu: zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný (BBCH 31-39).

Tritikale - septorióza pšenice, septorióza plevová

Ošetrovanie vykonávajú v štádiu konca klasenia: klas celkom vyrastený (BBCH 59).

Balenie:

0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l | HDPE/PA fľaša

1 l | Eko HDPE/PA fľaša

3 l, 5 l, 10 l | HDPE/PA kanister