

AGRITOX[®] 50 SL

Účinná látka: MCPA 500 g.l⁻¹

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentráту pre riedenie vodou určený proti dvojkličnolistovým burinám v obilninách, na lúkach a pasienkoch, v semenných porastoch tráv.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka prípravku preniká listovým pletivom do rastlín a nepriaznivo ovplyvňuje delenie buniek. Spôsobuje deformácie listov, stoniek a následné hynutie rastlín. Účinkuje na dvojkličnolistové jednoročné a trváce buriny.

SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

Citlivé buriny: reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, mrlík biely, pichliač roľný, štiavce, iskerníky, peniažtek roľný.

Stredne citlivé buriny: konopica napuchnutá, láskavec ohnutý, mak vlčí, veroniky, nezábudka roľná, chryzantémovka siatinová.

Odolné buriny: rumančeky, fialka roľná, hluchavky, lipkavec obyčajný, horčiaci, pakosty, zemedym lekársky.

NÁVOD NA POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA l.ha ⁻¹	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,4 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl [®] 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel [®] 300, Gliophar [®] 300 SL

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA l.ha ⁻¹	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean® 75 WG
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,4 l + (15-20g)	AT	(TM) Grodyl® 75 WG
tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	
obilniny s podsevom ďateliny	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	2,5-3,0 l	28 dní	
trávy	dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l	60 dní	semenné porasty

AT – ochranná doba je stanovená odstupom medzi termínom aplikácie (posledná aplikácia pred zberom).

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 300-400 l.ha⁻¹.

Obilniny bez podsevu: prípravok aplikujte od 4.listu do konca odnožovania obilniny (BBCH 14-29) 1x za sezónu.

Obilniny s podsevom: aplikujte 1x za sezónu a to v dobe, keď má ďatelina vyvinuté 2 trojlístky.

Semenné porasty tráv: ošetrte 1x za sezónu pri výške tráv 25-30 cm.

Lúky a pasienky: prípravok používajte 1x na jar pri výške iskerníku prudkého 15 cm až do fázy pukov.

Upozornenie

Nepostrekujte pri silnom slnečnom svite a teplotách nad +23°C! Ošetrte len zdravé, mechanicky nepoškodené porasty pri teplote nad +10°C pri miernej vzdušnej vlhkosti najlepšie za bezvetria v dobe, keď nehrozia mrazy a v nasledujúcich 4 hodinách neočakávejte dážď. Prípravok možno kombinovať s odporúčanými dávkami regulátorov rastu, DAM-390, močovinou a stopovými prvkami. Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia.

Balenie: 10 l HDPE kanister