

ALGEDI®

Účinná látka: Tritosulfuron 250 g.kg⁻¹, Dicamba 500 g.kg⁻¹

ALGEDI® je kombinovaný systémový herbicid prijímaný predovšetkým listami, čiastočne aj cez korene burín.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka tritosulfuron patrí do skupiny sulfonylmočovín. Herbicídna účinnosť spočíva predovšetkým v brzdení syntézy enzýmu acetolaktát syntetázy, ktorá je dôležitá pri tvorbe aminokyselín. Translokácia účinnej látky v rastlinách sa uskutočňuje bazipetálne a akropetálne. Účinná látka dicamba zo skupiny aminobenzoových kyselín ovplyvňuje hladinu auxínov v rastline a tým narušuje delenie buniek.

V pôde sa účinné látky ALGEDI® odbúravajú veľmi rýchle. Po jeho použití sa nemení pôdna mikroflóra, ani jej biologická aktivita.

Účinok sa prejaví po 3-5 dňoch zastavením rastu a buriny už v tomto štádiu prestávajú konkurovať plodine. Buriny postupne žltnú, v priebehu 2-3 týždňov úplne hynú. Účinok urýchľuje teplé a vlhké počasie.

Citlivé buriny: rumančeky, rumany, lipkavec obyčajný, pichliač roľný, mak vľčí, horčica roľná, kapsička pastierska, mrlíky, hluchavky, veroniky*.

Odolné buriny: stavikrv vtáčí, fialka roľná, prhlavy a všetky trávovité buriny.

*len so zmáčadlom

NÁVOD NA POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA l.ha ⁻¹	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
pšenica ozimná, tritikale	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) Dash
		0,2 kg + (0,1-0,125 l)	AT	(TM) Brejk Tru
jačmeň jarný	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,15 kg	AT	
		0,15 kg + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) Dash
		0,15 kg + (0,1-0,125 l)	AT	(TM) Brejk Tru
jačmeň ozimný, ovos siaty, raž ozimná	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,1-0,125 l)	AT	(TM) Brejk Tru
kukurica	dvojkličnolistové buriny	0,2 kg	AT	(TM) Dash
		0,2 kg+ (0,5 l)	AT	
		0,2 kg + (0,1-0,125 l)	AT	(TM) Brejk Tru

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 300-400 l.ha⁻¹.

Maximálny počet aplikácií 1x za vegetáciu.

Postrekujte v štádiu 2-6 listov burín (BBCH 12-16). Pri aplikácii na jar je najvýhodnejšie, keď sú ozimné obilniny v čase aplikácie v rastovej fáze od troch listov až do konca odnožovania (BBCH 13-29) jarné obilniny v rastovej fáze od 3 listov až do plného odnožovania (BBCH 13-25) a kukurica v rastovej fáze 3 až 5 listov (BBCH 13-15).

Upozornenie

Ak je potrebné zaoberať plodinu ošetrovanú prípravkom ALGEDI®, je možné ako náhradnú plodinu zaradiť jarné obilniny a kukuricu. Ako náhradné plodiny neodporúčame vysievať repku jarnú, repu cukrovú, hrach a sóju.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny.

Balenie: 1 l HDPE fľaša plnená do 0,8 kg; 2 l HDPE kanister plnený do 1,0 kg