

BARCA® 334 SL

Účinná látka: clopyralid 267 g.l⁻¹; picloram 67 g.l⁻¹

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na postemergentné ničenie jednoročných a vytrvalých dvojklíčnolistových burín v repke ozimnej a repke jarnej.

PÔSOBNIE PRÍPRAVKU

BARCA® 334 SL je herbicídny prípravok, vo forme koncentrátu pre riedenie vodou, obsahujúci dve účinné látky zo skupiny rastových regulátorov clopyralid a picloram, ktoré patria do skupiny Pyridine carboxylic acid t.j. pôsobia ako regulátor rastu - syntetické auxíny a sú určené proti jednoročným a trváčim dvojklíčnolistovým burinám v repke ozimnej a repke jarnej. BARCA® 334 SL je herbicíd so systémovým pôsobením, do rastlín preniká prevažne povrchom listov a stoniek. Citlivé buriny krátko po zasiahnutí zastavujú svoj rast. Dochádza k deformáciám a dekoloráciám listov a stoniek burín. Buriny po aplikácii následne nekonkurujú plodine a postupne odumierajú. Prvé symptómy sú viditeľné po 3-6 dňoch od aplikácie. Účinok prípravku BARCA 334 SL je za horúceho, vlhkeho počasia rýchlejší; pri nízkej teplote nastane úplné zničenie burín po asi 3 týždňoch. Prípravok účinkuje len na vzídené buriny, najúčinnšie ich ničí v štádiu 2-6 listov.

SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

Jarná aplikácia:

Buriny citlivé pre dávku prostriedku 0,25 l.ha⁻¹:

nevädza poľná, zemedym lekársky, mrlík biely, pichliač roľný, parumanček nevoňavý, ruman roľný.

Buriny stredne citlivé pre dávku prostriedku 0,25 l.ha⁻¹:

bocianik rozpukovitý, hluchavka purpurová, hviezdica prostredná, mlieč roľný, lipkavec obyčajný, pohánkovec ovijavý.

Buriny citlivé pre dávku prostriedku 0,35 l.ha⁻¹:

nevädza poľná, zemedym lekársky, mrlík biely, mlieč roľný, pichliač roľný, lipkavec obyčajný, pohánkovec ovijavý, parumanček nevoňavý, ruman roľný.

Buriny stredne citlivé pre dávku prostriedku 0,35 l.ha⁻¹:

hviezdica prostredná, bocianik rozpukovitý, hluchavka purpurová.

Odolné buriny: kapsička pastierska, fialka roľná.

Jesenná aplikácia:

Buriny citlivé pre dávku prostriedku 0,2 l.ha⁻¹: mrlík biely, ruman roľný.

Buriny stredne citlivé pre dávku prostriedku 0,2 l.ha⁻¹: nevädza poľná.

Odolné buriny: kapsička pastierska, fialka roľná.

NÁVOD NA POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA l.ha ⁻¹	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repka ozimná, repka jarná	lipkavec obyčajný	0,35 l	AT	jarná aplikácia
	rumančekovité buriny, pichliač roľný, dvojkľúčolistové buriny	0,25-0,35 l	AT	jarná aplikácia
repka ozimná	mrľík biely, ruman roľný	0,20 l	AT	jesenná aplikácia

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-300 l.ha⁻¹.

Rumančekovité buriny, lipkavec, mlieč roľný, pohánkovec ovijavý sú najcitlivejšie vo fáze 2-10 listov. Pichliač roľný vo fáze prízemnej ružice do 10 cm výšky rastlín. Mrľík biely je najcitlivejší do 5 cm výšky rastlín. Dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny pri ošetrovaní.

Repka jarná a repka ozimná - jarná aplikácia: Prípravok používajte na jar od obnovenia aktívneho vegetačného rastu burín, aplikujte ho od fázy 9 listov po fázu viditeľného prvého internódia (BBCH 19-31) repky. Optimálny aplikačný termín je pri teplotách +10 až +25 °C. Odporúčame vyššiu dávku postrekovej kvapaliny.

Postrek začína pôsobiť do 2 hodín po aplikácii. Dažďové zrážky po uplynutí tejto doby nenarušujú pôsobenie prípravku.

Prípravok nepoužívajte ak je porast mokrý, slabý, poškodený, ak je teplota vzduchu nižšia ako +8°C alebo vyššia ako +25°C, počas príliš suchého počasia, po celonočnom mraze a pred očakávaným mrazom.

Maximálny počet aplikácií v repke jarnej za vegetačné obdobie: 1x.

Repka ozimná - jesenná aplikácia: Prípravok používajte na jeseň vo fáze troch-päť listov repky (BBCH 13-15). Maximálna jednorazová dávka je 0,2 l.ha⁻¹.

Maximálny počet aplikácií v repke ozimnej je použitie 1x za 3 roky.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

V prípade nutnosti zaorania repky ozimnej i repky jarnej ošetrenej herbicidom BARCA 334 SL je možné s odstupom 1 mesiaca po postreku, premiešaní pôdneho profilu do hĺbky minimálne 10 cm a po predsejbovej príprave vysievať na jar repku jarnú, horčicu, kukuricu, pšenicu jarnú, jačmeň jarný. Ako následné plodiny po predchádzajúcom ošetroaní prípravkom je možné pestovať obilniny, trávnaté porasty a kapustovité plodiny. Všetky plodiny možno pestovať s odstupom 24 mesiacov po ošetroaní.

Balenie: PET fľaša 0,1 l, 0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l