

# KAPUT® GREEN

Účinná látka: glyphosate 360 g.l<sup>-1</sup> (IPA 483 g.l<sup>-1</sup>)

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentráту pre riedenie vodou určený na ničenie jednoročných a trvácich burín vo vinohradoch, ovocných sadoch, na strniskách a ornej pôde, nežiaducej vegetácie na nepoľnohospodárskej pôde a ostatných plochách v lesnom hospodárstve.

## PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

KAPUT® GREEN je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne len zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa docielí zničenie trvácich podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky vzídené semenné buriny. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v dobe aplikácie, aby bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Príznaky pôsobenia sú: postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnedenutie zasiahnutých rastlín behom 10-14 dní, za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu.

## NÁVOD NA POUŽITIE

| PLODINA  | ŠKODLIVÝ ČINITEL                   | DÁVKA<br>l.ha <sup>-1</sup> | OCHR.<br>DOBA | POZNÁMKA   |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--|
| jadroviny, kôstkoviny                                      | jednoročné buriny                  | 2 l                         | 35            |  |
|  | pýr a iné trváce buriny            | 3 l                         | 35            |  |
|  | pupenec                            | 6 l                         | 35            |  |
| vinič  | jednoročné buriny                  | 2 l                         | 35            |  |
|  | pýr a iné trváce buriny            | 3 l                         | 35            |  |
|  | pupenec                            | 6 l                         | 35            |  |
| strnisko, orná pôda  | pýr a iné trváce buriny            | 3 l                         | AT            |  |
| lesné škôlky a kultúry,<br>listnaté a ihličnaté<br>dreviny | buriny, nežiaduce<br>dreviny a kry | 5-10 %                      | AT            | náter čerstvých<br>rezných plôch<br>príkov t.j. do 8<br>hod po fažbe<br>- okrem doby<br>silného miazgo-<br>toku na jar |
|  |                                    | 33-50 %                     | AT            | knôtový rám  |

|  |   |                         |    |   |
|--|---|-------------------------|----|---|
| lesné škôlky a kultúry<br>(príprava pôdy pred<br>výsevom a výsadbou) | nežiaduca<br>vegetácia, jednoročné<br>a trváce buriny | 3,6 l (traktorové)      | AT | plochy po vy-<br>škôlkovaní, pred<br>škôlkovaním<br>zaburinený úhor<br>pred výsevom |
|  |   | 1,5-2 %<br>(chrbtové)   |    |   |
| celoplošné ošetrovanie<br>kultúr smreka,<br>borovice a jedle         | jednoročné a trváce<br>buriny                         | 2-4 l<br>t.j. 1,5-2,5 % | AT | pred pučaním<br>(na jar), po<br>vzretí letorastov<br>(august-<br>september)         |

## ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Množstvo vody: 150-200 l.ha<sup>-1</sup>

**Strniská, ovocné sady, vinohrady:** dávka vody 150-200 l.ha<sup>-1</sup>. Používajte aplikačné zariadenia s nízkym tlakom, nie väčším ako 0,1 MPa. Prípravok nepoužívajte na ovocné dreviny mladšie ako 2 roky a na vinič mladší ako 4 roky. Buriny majú byť v čase ošetrovania v plnom raste, max. 20 cm vysoké. Maximálny počet ošetrení: 1

**Lesné škôlky:** dávka vody 300-400 l.ha<sup>-1</sup>. Prípravok môžete použiť len 1x za sezónu. Dbajte o to, aby neboli zasiahnuté korene rastlín (chráňte ich krytmi) a susedné kultúry. Po aplikácii na korene dodržte kultivačný pokoj 60 dní pred a 28 dní po aplikácii.

Na ošetrovanom pozemku je zakázané pásť dobytok.

### Upozornenie

1. Nepostrekujte pri silnom vetre a v prípadoch, keď v priebehu 6 hodín po postreku očakávate dážď.
2. Pri vniknutí prípravku do pôdy je účinná látka pôdnymi mikroorganizmami v krátkom čase rozložená na neškodné látky.
3. Zabráňte zasiahnutiu zelených častí plodín a to buď priamym postrekom, alebo nepriamo úletom postrekovej tekutiny.
4. KAPUT® GREEN neskladujte v kovových nádržiach a nepoužívajte ani postrekovače s kovovými nádržami s pozinkovaným vnútrojškom, či z ľahkých kovov, príp. bez vnútornej povrchovej úpravy plastovými hmotami. KAPUT® GREEN môže v styku s kovom reagovať a vytvárať pritom ľahko zápalný plyn. V blízkosti nádrže je preto zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.
5. Kultiváciu pôdy po aplikácii robte až potom, keď sa prejavia účinky prípravku.

Rezistencia nebola zistená. Prípravok žiadnym spôsobom neovplyvňuje následné a náhradné plodiny. Susediace plodiny nesmú byť zasiahnuté priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmly! Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpisanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá, vtáky, ryby a ostatné vodné živočích, dážďovky, včely a iný užitočný hmyz. Domáce zvieratá nevpušťať na ošetrovanú plochu počas 10-14 dní po aplikácii.

**Balenie:** 0,1 l HDPE fľaša, 0,2 l HDPE fľaša, 1 l HDPE fľaša, 5 HDPE kanister, 20 l HDPE kanister, 25 l HDPE kanister, 200 l HDPE sud a 1000 l HDPE IBC kontajner