

METOLAFLEX®

Účinná látka: S-metolachlor 960 g.l⁻¹, (86,5 % hm)

Postrekový herbicíd vo forme emulzného koncentráту (EC) určený na ničenie prosovitých tráv v strukovinách, olejinách, kukurici a okopaninách.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

METOLAFLEX® brzdí klíčenie. Účinná látka S-metolachlor je prijímaná prostredníctvom koleoptily (trávy), klíčkov a koreňov (dvojkličnolistové buriny). METOLAFLEX® je špecificky pôsobiaci herbicíd proti prosovitým trávam a niektorým dvojkličnolistovým burinám. Potrebná je dostatočná vlhkosť pôdy na dosiahnutie zodpovedajúceho herbicídneho účinku; za sucha sa účinnosť prípravku znižuje.

SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

Citlivé buriny: ježatka kuria, metlička obyčajná, milota, moháre, portulaka zeleninová, psiarka roľná, rumančeky, stoklasy, proso, prstovka krvavá, žltica maloúborová.

Stredne citlivé buriny: cirok alepský zo semena, hviezdica prostredná, lesknice, hluchavka purpurová, kapsička pastierska, láskavce, lipnice, mätonohy, ovos hluchý, veroniky, zemedym lekárske.

Odolné buriny: fialka roľná, horčiaky, ľufok čierny, mrľik biely, podslnenčík Teofrastov, pohánkovec ovijavý, stavikrv vtáči a trváce buriny.

NÁVOD NA POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA g.ha ⁻¹	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25 l + (0,25-0,3 l) 1,25 l + (1 l)	AT AT	(TM) Callisto 480 SC, PRE, EPOST (TM) Callisto 100 SC, PRE, EPOST
hrach, bôb	jednoročné trávy	0,8-1,4 l	AT	-
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	1,4 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
šošovica	jednoročné trávy	0,8-1,4 l	AT	-
lupina	jednoročné trávy	1,4 l	AT	-
sója	jednoročné trávy	0,8-1,4 l	AT	-
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	1,4 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
slnečnica	jednoročné trávy	0,8-1,4 l	AT	-
repa cukrová, repa	ježatka, moháre	0,8-1,4 l	AT	-
krmna	jednoročné trávy	0,8 - 1,4 l	AT	-
zemiak	jednoročné trávy	0,8-1,4 l	AT	-
repka ozimná	jednoročné trávy	1,6 l	AT	-

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Množstvo vody: 400-500 l.ha⁻¹

Počet aplikácií: 1× za vegetačnú sezónu

Termíny použitia:

1. Povrchová predsejbová aplikácia - iba pre minimálne spracovanie pôdy, alebo pre bezorbový systém. METOLAFLEX® možno aplikovať už 30 dní pred sejbou plodín.
2. Predsejbové spracovanie (PPI-systém) - METOLAFLEX® aplikujte a následne zapracujte plytko do pôdy, max. 5 cm a to pred sejbou za použitia brán, diskov, rotavátora prípadne iného vhodného zariadenia.
3. Preemergentne - METOLAFLEX® aplikujte zároveň so sejbou alebo do 3 dní po sejbe, najneskôr však pred vzídením plodiny a burín. Dbajte pri ošetrení na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny. Povrch pôdy musí byť dobre pripravený, bez hrúd a pozberových zvyškov.
4. Skorá postemergentná aplikácia - prípravok aplikujte do rastovej fázy max. 1-2 listov trávovitých burín.

Upozornenie

METOLAFLEX® použitý v súlade s návodom nemá nežiaduce ani vedľajšie účinky na následné plodiny, susediace plodiny a rastliny/produkty na množenie.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny! Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny!

Balenie: 1 l HDPE fľaša; 5 l HDPE kanister