

MIX DOUBLE[®] EC

Účinná látka: phenmedipham 160 g.l⁻¹
desmedipham 160 g.l⁻¹

Postrekový herbicídny prípravok vo forme tekutého emulgovateľného koncentráту na ničenie dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej a repe kŕmnej.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

MIX DOUBLE[®] EC je postemergentný kontaktný herbicíd so širokým spektrom účinnosti proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám. Pôsobí výlučne cez listy vzídených burín a preto jeho účinnosť nie je závislá na type pôdy a pôdnej vlhkosti. Vyššie teploty a intenzita svetla po aplikácii jeho účinok urýchľujú a zosilňujú. Účinnosť na buriny sa prejavuje za 4-8 dní po aplikácii.

SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

Dvojklíčnolistové buriny sú na prípravok v závislosti na dávke citlivé od štádia klíčnych listov až do 4 pravých listov (BBCH 10-14).

Citlivé buriny (klíčne listy až základ 1. páru pravých listov) pri dávke 1,25 l.ha⁻¹:

láskavce (ohnutý, zelenoklasý), mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), lobody (konáristá, lesklá), reďkev ohnicová, horčica roľná, peniažtek roľný, hviezdica prostredná, pohánkovec ovijavý, veronika perzská, konopnica napuchnutá, žltica mnohoúborová, mak vlčí, zemedym lekársky.

NÁVOD NA POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL'	DÁVKA l.ha ⁻¹	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny, láskavce	2,5-3 l	AT	max. 1x
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	1,25-3l + (0,2-0,5l)	AT	(DA) TM Stemat [®] Super

DÁVKOVANIE PODĽA RASTOVÉHO ŠTÁDIA REPY

DÁVKA v l.ha ⁻¹	RASTOVÁ FÁZA REPY	DÁVKA VODY v l.ha ⁻¹
0,5-0,6 l	klíčne listy, základ pravých listov	150-200
0,8-1,0 l	prvý pár pravých lístkov	150-200
1,0-1,5 l	4 pravé listy	150-200
1,5-3,0 l	6 pravých listov	150-200

Pre zvýšenie herbicídnej účinnosti a rozšírenie spektra ničenia burín je vhodné kombinovať MIX DOUBLE[®] EC s prípravkami na báze ethofumesatu (STEMAT[®] SUPER).

Základná dávka herbicidu je 1,25 l.ha⁻¹. Pri súčasnom ničení lipkavca obyčajného a horčiakov je potrebné použiť kombináciu s prípravkami na báze ethofumesatu (STEMAT® SUPER). Je však nutné prihliadať na to, aby najmenšie repy v poraste mali vyvinutý aspoň prvý pár pravých listov.

V prípade, že buriny prerástli fázou kľúčnych až základ pravých listov je potrebné uvedené dávkovanie úmerne zvýšiť. Pri ničení prerastených burín je možné použiť dávku až 2,5 l MIX DOUBLE® EC na ha v samostatnej aplikácii alebo v TM kombinácii s prípravkom STEMAT® SUPER, najmenšie rastliny repy v poraste však musia mať plne vyvinuté aspoň 2 páry pravých listov.

ZMESI A POSTREKOVÉ PROGRAMY NA NIČENIE BURÍN

Vo fáze kľúčnych listov repy aplikujte prípravok MIX DOUBLE® EC v dávke 1,25-1,5 l.ha⁻¹ + 0,2-0,4 l.ha⁻¹ STEMAT® SUPER.

Od fázy 2 pravých listov repy možno použiť zmes 1,5-2 l.ha⁻¹ MIX DOUBLE® EC + 0,4-0,5 l STEMAT SUPER.

Vo fáze 4 pravých listov repy aplikujte 3 l.ha⁻¹ MIX DOUBLE® EC + 0,5 l.ha⁻¹ STEMAT® SUPER.

Dávka 3 l.ha⁻¹ však nesmie byť aplikovaná skôr ako repa dosiahne fázou 4 pravých listov.

Upozornenie

Po aplikácii môže prísť k prechodnému poškodeniu repy, ak sa rýchle strieda chladné a teplé počasie a s tým tiež nízka a vysoká svetelná intenzita, ďalej pri vysokých teplotách nad +23°C s intenzívnym slnečným svitom, ďalej pri poškodení a oslabení porastu repy chorobami a škodcami. Nepostrekujte pri nebezpečí nočných mrazíkov.

Zmes herbicidov nesmie byť pri postreku unášaná na susediace plodiny. Postrekovač musí byť pred použitím vyčistený a zbavený zvyškov iných prípravkov. I malé stopy, predovšetkým rastových herbicidov, v postrekovači môžu poškodiť porast repy cukrovej.

NÁSLEDNÉ PLODINY

MIX DOUBLE® EC je kontaktný herbicid, v pôde sa rýchlo rozkladá a nemá žiadny reziduálny účinok. Ak bol však použitý v zmesi s akýmkoľvek iným prípravkom, tak potom je potrebné dodržať príslušné opatrenia uvedené na etikete druhého prípravku. Ak je nutné z akýchkoľvek dôvodov ošetrený porast repy predčasne zorať, je možné ako následné plodiny vysiať repu cukrovú, repu kŕmnu, hrach, bôb, ľan, kukuricu, špenát, lucernu a trávne zmesi. Pred výsevom uvedených plodín (s výnimkou repy) je potrebné pozemok zorať do hĺbky 15-20 cm

PRÍPRAVA TANK-MIXU A ZMESÍ

MIX DOUBLE® EC nalejte do nádrže s dávkou 50-100l vody, pri spustenom miešadle doplňte vodou a za stáleho miešania pridajte koreňový herbicid. V prípade, že používate GONDOR®, ten dajte do nádrže ako prvý.

Na prípravu postrekovej kvapaliny nepoužívajte príliš tvrdú alebo znečistenú vodu, ani vodu s vysokým obsahom železa. Pripravenú postrekovú kvapalinu je potrebné ihneď spotrebovať. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty! Prípravky vlievajte do nádrže oddelene, postrekovú kvapalinu nepripravujte do zásoby! Doba od prípravy po jej aplikáciu by nemala byť dlhšia ako 2 hodiny.

Balenie: 5 l HDPE kanister