

# PARDNER<sup>®</sup> 22,5 EC

Účinná látka: bromoxynil 225 g.l<sup>-1</sup>

Postrekový herbicídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentráту určený proti dvojkľúčnicovým burinám v obilninách a kukurici.

## PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

PARDNER<sup>®</sup> 22,5 EC pôsobí prevažne ako dotykový a čiastočne systémový herbicíd na vzídené dvojkľúčnicové buriny, ktoré sú v rastovej fáze 2-4 pravých listov. Bromoxynil je prijímaný listami a blokuje fotosyntézu burín. Zpôsobuje zasychanie burín a ich následné odumieranie. Účinnosť na buriny sa prejavuje do 24 hodín po ošetrovaní drobnými nekrotickými škvrnami. Citlivé druhy burín ničia za 2-3 dni po ošetrovaní, k úplnému zničeniu burín dochádza zvyčajne za 4-5 dní po postreku. Účinnosť prípravku priaznivo ovplyvňuje vyššia teplota a slnečný svit pri aplikácii a po nej. Neodporúčame ošetrovať pri teplotách vyšších ako +25°C.

## SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

**Citlivé buriny:** red'kev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, mrlík obyčajný, horčičky (obyčajný, štiavolistý), rumančeky, parumanček nevoňavý, láska, ľaskavce, ľufok čierny, ľipkavec obyčajný, mak vľčí, veroniky, durman, zemedym lekárske, peniažtek roľný.

**Stredne citlivé buriny:** konopnica napuchnutá, hviezdička prostredná, ľhľuchavky, ľialka roľná. Dočasne poškodzuje viacročné ľhboko koreniace buriny ako sú pichľiáč roľný, ľmieč roľný, ľprasľička roľná.

## NÁVOD NA POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA l.ha <sup>-1</sup>	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jačmeň ľarný, jačmeň oz., ovos, raž, pšenička ľarná, pšenička oz., tritikale	dvojkľúčnicové buriny	1-1,5 l	AT	
	odolné dvojkľúčnicové buriny	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel <sup>®</sup> 300
obilniny s podsevom ľucery	dvojkľúčnicové buriny	1-1,5 l	AT	
kukurica	dvojkľúčnicové buriny, ľaskavce, ľipkavec	1,25-1,5 l	AT	
	dvojkľúčnicové buriny a ľjednoročné trávy	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Laudis <sup>®</sup> OD
1,0 l + (2,0 l)		AT	(TM) Monsoon <sup>®</sup> , Equip <sup>®</sup> Ultra, Musketeer <sup>®</sup> Plus	

## ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Dávka vody na 400–600 l.ha<sup>-1</sup>.

Počet ošetrení: max 1x za sezónu.

Obilniny s podsevom lucerny ošetríte v dobe, keď má lucerna vyvinutý aspoň jeden trojlístok a buriny majú 2-4 pravé listy (BBCH 12-14). Na prerastené buriny sa herbicídny účinok znižuje.

Obilniny možno ošetrovať od 2 listov do začiatku predlžovania stebľa (BBCH 12-30).

Kukuricu ošetríte v dobe, keď majú buriny 2-4 pravé listy (max. 6 listov, t.j. BBCH 12-14, max. 16) a výška kukurice nepresiahne 20 cm. Neošetríte pri teplotách nad +20°C! Vyššiu dávku použijete na pokročilejšie rastové fázy burín, prípadne buriny v listovej ružici. Nepoužívajte na malé rastliny kukurice, zoslabnuté porasty, ošetríte najmenej 6 hodín pred predpokladaným dažďom.

## PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odmerané množstvo prípravku vlejete za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tankmix kombinácií v menšej nádobe pri správnom nariadení. Kontrolujte možnosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 min. státi! Najskôr rozpustíte práškové prípravky, až potom vlejete tekuté.

## MENEJ VÝZNAMNÉ POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA l.ha <sup>-1</sup>	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	dvojkľúčolistové buriny	0,5-1 l	28 dní	

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytoxicita neboli hodnotené!

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody 200–400 l.ha<sup>-1</sup>.

Počet ošetrení: max. 1 x za sezónu.

Cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky: prípravok aplikujte v rastovej fáze 1. listu až jasne viditeľného 3. listu cibule (BBCH 11-13), max. do 4 listov buriny (BBCH 14).

**Balenie:** 5 l coex kanister