

RANGO[®] SUPER

Účinná látka: quizalofop-p-tefuryl 40 g.l⁻¹

Postrekový herbicidný prípravok vo forme emulgovateľného koncentráту určený na postemergentnú aplikáciu proti jednoročným a trváčim trávam v repe cukrovej, repke ozimnej, hrachu a v iných plodinách.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok RANGO[®] SUPER je selektívny postemergentný herbicid so systémovým účinkom. Účinná látka quizalofop-P-tefuryl náleží do skupiny aryloxyfenoxypropionátov (FOPs) a pôsobí ako inhibitor syntézy lipidov. Je absorbovaná povrchom listov a translokovaná po celej rastline aj xylémom aj floémom, a hromadí sa v meristematickom tkanive. Účinnok sa prejavuje sa farebnými zmenami citlivých rastlín – žltnutie alebo fialovenie. Zasiahnuté citlivé trávy hynú v závislosti na teplote počas 2 - 3 týždňov.

Citlivé buriny: cirok alepský, ježatka kuria, ovos hluchý, proso siate, prstovka krvavá, výmrv obilnín, pýr plazivý.

NÁVOD NA POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA l.ha ⁻¹	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repa cukrová, repa krmná, šošovica, hrach, fazuľa, bôb, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, mrkva, mrkva krmná, ľan	jednoročné trávy	1-1,5l	AT	
	pýr	2,25l	AT	
pažitka, petržlen, cibuľa	jednoročné trávy	1-1,5l	AT	semenné porasty
	pýr	2,25l	AT	semenné porasty
repka ozimná	jednoročné trávy, výdrv obilnín	1-1,5l	AT	
	výdrv obilnín	0,8l	AT	skorá jeseň
	pýr	2-2,25l	AT	
zemiak	jednoročné trávy	1-1,5l	AT	
	pýr	2,25l	AT	

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Odporúčaná dávka vody: 200-400 l.ha⁻¹; v prípade sucha, vysokých teplôt a pri veľkej biomase odporúčame použiť hornú hranicu dávky vody.

Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetačné obdobie.

Prípravok aplikujte v období, keď sú trávy v plnom raste, v repke na jeseň proti skorým rastovým štádiám výmrvu obilnín do 3 listov postačí dávka 0,8 l.ha⁻¹. Vhodný termín aplikácie pre jednoročné trávy je od vývojového štádia 2 listov až do konca odnožovania, pre trvácé trávy od vývojového štádia 4-6 listov (pri výške 10-15 cm).

RANGO® SUPER sa nesmie používať vo zmesi s akýmkoľvek ďalším prípravkom obsahujúcim „fop“ (aryloxyfenoxypionát) skupinu herbicídov alebo následne s akýmkoľvek herbicídov ACC-áza inhibitorom počas jednej vegetačnej periódy. Ak je to možné, tak na ničenie včasne vzídených burín (pred vzídením plodiny) používajte neselektívne herbicidy. Vyhnite sa ďalšiemu použitiu rovnakého herbicidu alebo herbicídov, ktoré majú rovnaký spôsob účinku na rovnakom poli, pokiaľ to nie je integrované s ďalšími postupmi hubenia burín.

Pri použití prípravku v súlade s návodom k použitiu nemá nepriaznivý vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny.

Balenie: 1 l HDPE fľaša, 5 l HDPE kanister, 10 l HDPE kanister