

ACTIFLOW[®] Zn 680

HNOJIVO ES

Suspenné hnojivo na báze zinku.

Zloženie: zinok vo vode rozpustný 40,1% (680 g.l⁻¹);

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

ACTIFLOW[®] Zn 680 je určený pre aplikáciu na listy. Hnojivo je povolené na použitie v organickom poľnohospodárstve v súlade s Nariadením (ES) č. 834/2007.

! DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !

Prípravok ACTIFLOW[®] Zn 680 je povolený pre použitie v ekologickom poľnohospodárstve v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov.

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

PLODINA	DÁVKA l.ha ⁻¹	APLIKÁCIA
kukurica	1 l.ha ⁻¹ min. 200 l vody.ha ⁻¹	1 aplikácia od štádia 5-6 listu
ozimné obilniny	0,5 l.ha ⁻¹ min. 200 l vody.ha ⁻¹	preventívne pred obdobím zimného kľudu
jarné obilniny	0,5 l.ha ⁻¹ min. 200 l vody.ha ⁻¹	2. kolenko
strukoviny	0,5-1 l.ha ⁻¹ min. 200 l vody.ha ⁻¹	1 aplikácia od fázy dosiahnutia výšky rastu 5-15 cm
kôstkoviny	0,5 l.ha ⁻¹ min. 500 l vody.ha ⁻¹	na začiatku nasadzovania plodov a aplikácie opakovať 15 dňových intervaloch
kôstkoviny použité po zbere	1-2 l.ha ⁻¹ min. 500 l vody.ha ⁻¹	pred opadom listov
jadroviny	0,5 l.ha ⁻¹ min. 500 l vody.ha ⁻¹	6 týždňov po opade korunných lupienkov
jadroviny použité po zbere	1-2 l.ha ⁻¹ min. 500 l vody.ha ⁻¹	pred opadom listov
chmeľ	0,5-1 l.ha ⁻¹ min. 300 l vody.ha ⁻¹	vo fáze BBCH 30-40
mak	0,5 l.ha ⁻¹ min. 200 l vody.ha ⁻¹	vo fáze 6-8 list
vinič	1 l.ha ⁻¹ min. 200 l vody.ha ⁻¹	2 aplikácie od štádia objavenia kvetenstva (BBCH 53)

HNOJIVÁ

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, použite dostatočné množstvo vody, až z povrchu plodiny začne stekať. Vyhnite sa postrekovaniu v čase silného slnečného žiarenia alebo pri vysokých teplotách vzduchu. Ak je to možné, aplikujte večer alebo skoro ráno, neaplikujte ak je denná teplota vyššia ako 28 °C. Veľmi mladé listy a plodiny, ktoré sú v strese môžu byť náchylnejšie na spálenie. Za týchto okolností by sa mali používať nižšie dávky a interval aplikácií primerane zredukujte. Pozrite odporúčania pre aplikačné dávky a termíny aplikácie pre jednotlivé plodiny uvedené na tejto etike.

PRÍPRAVA APLIKAČNEJ KVAPALINY

1. Nádrž postrekovača naplňte polovicou požadovaného množstva vody a zapnite miešacie zariadenie.
2. Pridajte potrebné množstvo tohto produktu a potom pridajte zvyšok vody. Miešacie zariadenie ponechajte zapnuté. Pri miešaní s ďalšími zložkami tank-mix zmesi, tento produkt pridávajte vždy až po práškových produktoch. Nenechajte zmes stáť bez zapnutého miešacieho zariadenia.
3. Po postreku dôkladne vyčistite a opláchnite postrekovač.

Fyzikálno-chemické vlastnosti:

hustota: 1,7 kg.l⁻¹

SKLADOVANIE

Uchovávajte v pôvodných obaloch, tesne uzatvorené, oddelene od detí, zvierat a potravín. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Balenie: 5 l HDPE kanister