

FIXA[®] Cu

HNOJIVO ES

Roztok hnojiva na báze medi (síran).

Zloženie: meď spolu = 8,9 % (120 g.l⁻¹); SO₃ vo vode rozpustný 11 % (146 g.l⁻¹)

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

FIXA[®] Cu je hnojivo povolené na použitie v organickom poľnohospodárstve v súlade s Nariadením (ES) č. 834/2007.

FIXA[®] Cu je kvapalný koncentrát s vysokým obsahom medi.

FIXA[®] Cu je určená na prevenciu proti nedostatku medi a na akútne vyrovnanie možného deficitu tohto mikroprvku v rastlinách.

FIXA[®] Cu je vybavená LS formuláciou, ktorá zlepšuje aplikáciu postrekom, príľnavosť k rastlinám a zabezpečí lepšiu odolnosť voči odkvapkávaniu postrekovej kvapaliny.

LS formulácia zabezpečuje vynikajúcu pokrývnosť postreku a ovlhčenie povrchu ošetreného porastu, ktoré je potrebné k prieniku živín do rastliny.

Hnojivo veľmi výrazne zlepšuje niektoré fungicídne ošetrenia a zdravotný stav poľných plodín.

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

PLODINA	DÁVKA l.ha ⁻¹	APLIKÁCIA
obilniny	2 l.ha ⁻¹ min. 200 l vody.ha ⁻¹ 1 l.ha ⁻¹ min. 200 l vody.ha ⁻¹	1 až 2 aplikácie od prvých štádií do klasenia (klas má dĺžku 1 cm) po štádiu 2. kolenka
zemiaky a cukrová repa	2 l.ha ⁻¹ min. 200 l vody.ha ⁻¹	1 aplikácia po zapojení porastu
ostatné plodiny a zelenina	2 l.ha ⁻¹ min. 200 l vody.ha ⁻¹	1 až 2 aplikácie v 10-14 dňových intervaloch

Listová aplikácia medi veľmi pozitívne vplýva na zlepšenie využitia dusíka z aplikovaných priemyselných hnojív najmä v jarnom chladnom období. Meď je dôležitá aj v druhej polovičke vegetácie, kde priamo vplýva na výšku výnosov.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, použite dostatočné množstvo vody, až z povrchu plodiny začne stekať. Vyhnite sa postrekovaniu v čase silného slnečného žiarenia alebo pri vysokých teplotách vzduchu. Ak je to možné, aplikujte večer alebo skoro ráno, neaplikujte, ak je denná teplota vyššia ako 28 °C. Veľmi mladé listy a plodiny, ktoré sú v strese môžu byť náchylnejšie na spálenie. Za týchto okolností by sa mali používať nižšie dávky a interval aplikácií primerane zredukujte. Pozrite odporúčania pre aplikčné dávky a termíny aplikácie pre jednotlivé plodiny uvedené na tejto etike.

PRÍPRAVA APLIKAČNEJ KVAPALINY

1. Nádrž postrekovača naplňte polovicou požadovaného množstva vody a zapnite miešacie zariadenie.
2. Pridajte potrebné množstvo tohto produktu a potom pridajte zvyšok vody. Miešacie zariadenie ponechajte zapnuté. Pri miešaní s ďalšími zložkami tank-mix zmesi, tento produkt pridávajte vždy až po práškových produktoch. Nenechajte zmes stáť bez zapnutého miešacieho zariadenia.
3. Po postreku dôkladne vyčistite a opláchnite postrekovač.

Fyzikálno-chemické vlastnosti:

hustota: 1,34 kg.l⁻¹

SKLADOVANIE

Uchovávať v pôvodných obaloch, tesne uzatvorené, oddelene od detí, zvierat a potravín. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Balenie: 10 l HDPE kanister