

WUXAL® SULFUR

Kvapalné ES hnojivo, roztok dusikátého hnojiva SO₃ (52,5 g.l⁻¹) s mikroživinami na použitie v repke, obilninách, cukrovej repe, kukurici a v zelenine.

Zloženie: N - spolu 15 % (198 g.l⁻¹), amon. N 9,2 % (121 g.l⁻¹), močov. N 5,8 % (77 g.l⁻¹), oxid sirový (SO₃) vo vode rozpustný 52,5 % (693 g.l⁻¹), B 0,01 % (0,132 g.l⁻¹), Cu 0,004 % (0,052 g.l⁻¹), Fe 0,02 % (0,264 g.l⁻¹), Mn 0,012 % (0,158 g.l⁻¹), Mo 0,001 % (0,013 g.l⁻¹), Zn 0,004 % (0,052 g.l⁻¹), B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn sú vo vode rozpustné v cheláte s EDTA.

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

WUXAL® SULFUR má okrem obsahu dusika a všetkých stopových mikroživín aj veľmi vysoký obsah síry. Toto zloženie živín je obzvlášť dôležité pre syntézu proteínov, lebo ako sira aj dusík sú obsiahnuté v aminokyselinách, ako je metionín a cysteín. Sira a dusík sú známe svojim synergickým účinkom na metabolizmus rastlín. Sira je tiež zapojená v odolnosti rastlín voči chorobám. Všetky kationové stopové prvky sú plne a silno chelátované, a preto dobre dostupné pre príjem listami a transport vo vnútri rastliny.

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Najlepší účinok sa dosiahne, keď je WUXAL® SULFUR aplikovaný skoro ráno alebo v podvečer, alebo keď je zamračené.

PLODINA	DÁVKA l.ha ⁻¹	POZNÁMKA
repka olejná	3-5 l	v priebehu vývoja listovej plochy (jesenná aplikácia štádium 4-6 listov pre ozimnú repku olejnú) na začiatku predĺžovacieho rastu
obilniny (oz. pšenica, oz. jačmeň)	3-5 l	odnožovanie začiatok predĺžovacieho rastu až do prvého kolienka
kukurica	5 l	štádium 4-6 listov štádium 10 listov
cukrová repa	3-5 l	štádium 4-6 listov štádium 6-8 listov
hlúbová zelenina	3-5 l	štádium 6-8 listov opakovať po 10 dňoch
cibuľa, cesnak	3-5 l	5 alebo viacero listov viditeľných začiatok tvorby cibule
špenát	5 l	v priebehu vývoja listov (hlavného výhonku) dva týždne pred zberom
šalát	3-5 l	v priebehu vývoja listov (hlavného výhonku) dva týždne pred zberom

Pri aplikácii na repku olejnú a hlúbovú zeleninu odporúčame aplikovať zmes hnojiva WUXAL® SULFUR s 3-5 l.ha⁻¹ hnojiva WUXAL® OILSEED.

Neodporúčame aplikovať v priebehu kvitnutia alebo dozrievania.

MIEŠATEĽNOSŤ, PRÍPRAVA POSTREKU

WUXAL® SULFUR je miešateľný s väčšinou pesticídov. Pre postrek odporúčame použiť dostatočné množstvo vody 400 l.ha⁻¹.

Aj keď WUXAL® SULFUR je kompatibilný s väčšinou bežne používaných pesticídov, pri prvom používaní hnojiva odporúčame vykonať skúšku miešateľnosti

Pri plnení nádrže postrekovača dodržte nasledovný postup:

1. Do nádrže dať cca 1/2 celkového množstva vody.
2. Zapnúť miešanie.
3. Pridať odmerané množstvo WUXAL® SULFUR. Starostlivo vypláchnuť obal a pridať do nádrže.
4. Podľa potreby pridať iný typy Wuxalov.
5. Potom podľa potreby pridať pesticídy.
6. Nádrž doplniť vodou na stanovený objem.
7. Pripravená zmes musí byť čím skôr vystriekaná, nemôže byť pripravovaná do zásoby.

Pokyny pre skladovanie a manipuláciu:

Prípravok je potrebné skladovať v dobre uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých uzamknutých a chladných skladoch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, kyselín, zásad, olejov a horľavých látok a obalov od týchto látok. Chráňte produkt pred znečistením, vysušením a pred mrazom, teplotami pod +5 °C a nad +40 °C. Odporúča sa uložiť prípravok v sklade tak, aby bol chránený pred vplyvom počasia, slnečným žiarením, prehriatím a znečistením. Zabráňte väčšiemu kolísaniu teplôt.

Balenie: 20 l